

Acest document va fi un WORK IN PROGRESS - completat in functie de nevoi si de timp.

Accidentele vasculare cerebrale din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Potrivit medicinei alopate, un accident vascular cerebral este cauzat fie de un vas de sange inchis (insuficient oxigen in zona cerebrala = „infarct ischemic”), fie de o hemoragie cerebrala („hemoragie intracerebrala”). Rezultatul: pierderea de celule nervoase.

Din punctul de vedere al celor 5 legi biologice ale naturii, vasele blocate sunt mult mai rare decat se crede in general. Vasele de sange ale tuturor organelor, inclusiv cele ale creierului, sunt aranjate intr-o retea de tip plasa. O eventuala ocluzie a vaselor este "corectata" prin asa-numitele vase colaterale si formarea de noi vase. Dupa dr. Hamer, si sangerarea la nivelul creierului (hemoragie intracerebrala) apare rar. Medicii cauta adesea in van hemoragii cerebrale, iar in final dau vina pe cine stie care vase de sange, deoarece nu gasesc nimic altceva.

In NMG cunoastem doua tipuri de accidente vasculare cerebrale. Ambele au ca si cauza un conflict de natura motorie. Primul, si cel mai rar tip, este asa-numitul accident vascular cerebral rece = paralizie in faza de conflict activ. Al doilea, si cel mai frecvent tip, este asa-numitul accident vascular cerebral cald. Acesta are loc in faza de vindecare.

Accidentul vascular cerebral rece

CONFLICT: Conflict motor. Spaima, incordare. Conflict de a nu putea, a nu avea voie sau a nu dori sa se miste. Accidentele duc adesea la conflicte motorii.

Muschii faciali: a fi facut de ras.

Musculatura umar – spate: a nu putea evita pe cineva sau ceva.

Picior si brat, musculatura la indoire si tragere (muschi aductori): a nu putea retine ceva sau pe cineva, a nu putea tine aproape si imbratasa pe cineva.

Picior si brat musculatura la intindere si largire (muschi abductori): a nu putea scapa de cineva sau ceva, a nu putea da la o parte sau evita ceva sau pe cineva, a nu se putea apara de cineva.

Picioarele in general: a se simti complet pierdut. A nu putea fugi, evada sau prinde din urma. A nu putea fugi destul de repede, urca, merge in sus sau in jos, a nu putea dansa, sari, a nu-si putea tine echilibrul, etc.

TESUTURI: Musculatura striata – scoarta cerebrala – ectoderm (inervare, alimentarea neuronilor) si substanta alba - mezoderm (nutritie).

CONFLICT ACTIV: Paralizie, adesea doar o slabiciune a grupului muscular afectat = accident vascular cerebral rece. Semne de simpaticotonie precum maini reci, gandire compulsiva, insomnie, pierdere in greutate, etc. Medicina conventionala in mod normal nu denumeste aceste paralizii ca accidente vasculare cerebrale, ei folosesc denumiri ca MS (scleroza multipla) sau ALS (scleroza amiotrofica laterala).

SENSUL BIOLOGIC: Reflexul de a face pe mortul: multe animale se prefac moarte atunci cand sunt urmarite sau atunci cand situatia este fara speranta (de exemplu puiul de cerb, soarece, sarpe). Urmaritorul atunci renunta sau chiar nu isi vede prada. Carnivorii - pisicile, de exemplu - sunt interesati numai de "obiectele in miscare". Cand pericolul a trecut, paralizia dispare.

FAZA DE VINDECARE: Refacerea nervilor. Paralizii se imbunatatesc treptat, deoarece conexiunile nervoase (sinapse) din creier se largesc (sunt disociate) datorita edemului de vindecare.

CRIZA EPILEPTOIDA: Convulsii, crampe, crize epileptice sau crize multiple.

OBSERVATII: Conteaza lateralitatea (dreapta sau stanga) si partea (mama, copil sau partener).

Grupele musculare afectate cel mai puternic arata tipul de conflict. De exemplu, in cazul in care muschii aductori din dreapta sunt afectati, pentru un pacient dreptaci este vorba de conflictul de a

nu putea sa-si tina partenerul (alte persoane decat mama si copil).

Alte organe si/sau un releu in creier pot juca un rol in atacul cerebral: daca persoana are tulburari de vorbire, de exemplu, este vorba despre un conflict de spaima/frica sau de amutire in faza de vindecare. Lacunele de memorie (absenta) pot duce, de asemenea, la un diagnostic de accident vascular cerebral = conflict de separare in criza epileptoida din faza de vindecare.

TERAPIE: Intelegerea procesului. Ganduri: „Stiu acum ce se intampla si ma eliberez”, „O sa ma pot misca in curand exact ca inainte.”

Fizioterapie, dar fara presiune.

Masaje clasice, acupunctura, reflexoterapie si masaj

Cayce: masaje puternice cu ulei de alune sau de masline, cu tinctura de mir.

Inot, gimnastica, yoga.

Bai de picioare cu clorid de magneziu (MgCl₂)

Bai de soare, eventual solar

Perieri si dusuri scotiene

Complex de vitamine B

Masaje cu ulei de rozmarin, de scortisoara sau camfor

Eventual LDN (low-dose Naltrexone)

Terapia alopata cu cortizon si interferon nu este recomandata, deoarece nu ajuta la progres.

Accident vascular cerebral cald

Acelasi program biologic ca mai sus sau alt program biologic, de exemplu un edem cerebral in faza de vindecare in substanta alba > comprimarea scoartei cerebrale adiacente > pierderea functiilor motorii > medicina alopata > "atac cerebral".

EXEMPLE:

- *De mic, pacientul dreptaci este educat strict de catre o mama dominanta. Cu prima ocazie, fugе de acasa. Este singurul copil si se simte responsabil pe viata pentru mama lui. Daca el nu o viziteaza destul de des, se simte vinovat = conflict motor, de a nu fi capabil sa se elibereze de mama lui. La doi ani dupa moartea mamei sale, pacientul in varsta de 59 de ani are un accident vascular cerebral caruia abia ii supravietuieste = vindecarea conflictului motor. Sunt afectati in special muschii abductori ai bratului si piciorului de pe partea stanga, mama/copil. (Arhiva personala B.Eybl)*
- *Timp de douazeci de ani, pacientul dreptaci in varsta de 45 de ani lucreaza impotriva dorintei lui pentru o firma = conflict motor de a nu fi in stare sa mearga in directia pe care si-o doreste, a nu putea scapa de firma. In final, demisioneaza pentru a-si deschide propria afacere (visul lui de-o viata), dar nu mai reuseste. Chiar in ziua de deschidere a cabinetului (visul lui de-o viata), are un accident vascular cerebral = rezolvarea conflictului motor. Partea afectata este dreapta, cea a partenerului. (Arhiva personala B.Eybl)*

FAZA: FAZA DE VINDECARE: Maini si picioare fierbinti, cresterea apetitului, posibila febra, ameteli, dureri de cap pana la pierderea cunostintei - semne ale vagotoniei. Cel mai frecvent simptom: paralizia partiala, a bratului sau a piciorului pe o parte a corpului.

Focarul Hamer din creier se umfla datorita edemului si comprima zonele din jur. Dupa ani de zile sau decenii de conflict activ, faza de vindecare survine cu un accident vascular cerebral dramatic.

Pretul platit pentru un conflict activ de lunga durata este, de obicei, o recuperare incompleta, uneori si decesul pacientului din cauza edemului cerebral. Intr-o scanare CT acest edem este adesea diagnosticat gresit ca "hemoragie intracraniana."

TERAPIE:

In faza acuta: Conflictul a fost rezolvat. Se insoteste vindecarea! A se vedea faza de vindecare la

nivel cerebral, p. 56.

Dupa faza acuta: La nivel fizic, medicina traditionala face lucrurile corect: masuri de reabilitare - fizioterapie, masaje, inot, etc. Exersat, exersat, exersat, dar cu atitudinea corecta!

Din punct de vedere sufletesc, pacientul si-a rezolvat unul sau mai multe conflicte majore, altfel nu ar fi avut un accident vascular cerebral. Numai ca paralizile sau alte impedimente functionale insemna de multe ori un nou conflict pentru pacient, mai ales in cazul in care progresele sunt lente. De exemplu, un conflict motor: "Nu-mi mai pot misca piciorul"; conflict genital: "Nici macar la pat nu mai sunt bun de nimic, sotia mea va incepe sa caute pe altcineva!" > Acceptati situatia asa cum este ea, avand incredere in vindecare si ameliorare. Renuntarea este la fel de rea ca si asteptarile prea ridicate.

Amigdalita din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: La amigdale de obicei e vorba de un conflict de "imbucatura".

Amigdala dreapta = nu a reusit sa "inghita" (sa primeasca) ceva dorit, din cauza de prea putina saliva.

Amigdala stanga = nu a reusit sa "scurte" ceva nedorit, din cauza de prea putina saliva.

EXEMPLU: un copil e silit sa manance ceva ce nu-i place

EXEMPLU: un copil nu primeste cadoul dorit; un copil este intarcat prea devreme; un copil face si constipatie, neputand sa elimine ceva. La rezolvarea conflictului vine si amigdalita!

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: cresterea functionalitatii amigdalelor, evtl. aparitia unei asa zise "tumori", marirea amigdalelor si a polipilor; evtl. greutati la inghitit sau in respiratie.

SENS BIOLOGIC: cu mai multe celule, se produce mai multa saliva, pt. ca "imbucatura" sa alunece mai bine inautru sau sa iasa afara.

FAZA DE VINDECARE: normalizare functionala, "tumoarea" este descompusa (deconstructie branzos-tuberculoasa daca mai sunt prezente in organism micobacteriile tuberculoase si nu au fost distruse de vaccinari, resturile celulare se transporta prin sistemul limfatic), angina; stramtarea gatului datorita inflamarii; uneori agravarea simptomelor daca apare sindromul** (vezi la final); dureri, inflamare, halena fatida bucala, puroi la amigdale, abces la amigdale, transpiratii noaptea...

In caz de recidive, apar amigdalele "crestate", "zimtate".

TERAPIE: Conflictul este rezolvat, se sustine vindecarea.

Daca recidiveaza:

Ganduri principale: "Sunt multumit cu ceea ce am", "Nu pot avea chiar tot". Daca un conflict recidiveaza de prea multe ori, iar amigdalele ajung de-a dreptul zdrentuite, se pot scoate prin operatie.

TERAPIE pt. inflamariile din zona faringelui:

Ceaiuri: musetel, salvie, schinduf, anason;

Bitter suedez: plimbat in gura 5 min., gargara, abia apoi inghitit;

Gargara cu apa cu sare de mare (introduce electroliti in corp si reduce inflamatia);

Gargara: se fierb coji de nuca si se lasa cateva ore sa traga, apoi se strecoara, se pune la rece si se face gargara de cateva ori pe zi;

Bors pt. stimularea simbiotilor responsabili cu curatenia celulara;

Cataplasme cu branza de vaci.

Artrita (incl. "artrita juvenila" etc) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de devalorizare.

ORGAN AFECTAT:

Umeri = conflict de devalorizare; simtim ca nu suntem parinti buni, copii buni (umarul stang la dreptaci) sau simtim ca nu suntem parteneri buni (umarul drept la dreptaci)

Genunchi = conflict de devalorizare de natura "sportiva"; nu ne simtim apreciati, nu ne este satisfacuta

dorinta de reusita, ambitia; uneori conflict de devalorizare local (nu putem sa alergam, sa sarim, sa calcam asa cum vrem).

Coate = conflict de devalorizare de a nu putea imbratasa, a nu putea tine, a nu putea arunca, impinge, a nu se putea apara. Coatele pot deveni si echivalentul genunchilor > conflict de ambitie nerealizata (jucatori de tenis, handbal, oameni care lucreaza cu bratele etc.)

Mainile si degetele = devalorizare legata de neindemanare, socul de a fi tratat gresit pe cineva, de a se fi apucat de o chestie gresita, de a fi facut ceva gresit, de a fi dat-o in bara de ex. la o activitate unde e nevoie de maini etc. Apare adesea la perfectionisti.

Glezna, laba piciorului, degetele de la picioare = conflict de devalorizare de tipul "nu voi rezista la aceasta situatie" sau de a nu putea alerga, sari, de a nu putea calca sau frana etc.; adesea si conflict legat de locul unde ne aflam.

TESUT AFECTAT: tesutul osos, cartilagiile, meniscurile - strat medular - mezoderm

FAZA: faza de vindecare - reconstructie a tesutului (periostului) prin metabolism marit: dureri, zona umflata, inrosita. Accentuare prin *sindrom* (vezi la final)

LATERALITATE: stanga = mama-copil; dreapta = partener, servicii, viata in general

TERAPIE: Conflictul este rezolvat; se insoteste procesul de vindecare; se evita recidivele!

Menajare, stat cat mai mult cu picioarele sus (la durerile de genunchi); miscare nedureroasa.

Esenta masurilor de natura strict fizica: deviere de energie spre inafara!

GANDURI DE BAZA: "durere = vindecare!", "Am incredere in mine si privesc cu optimism in viitor!", "Am incredere ca Dzeu ma conduce asa cum trebuie"

MASURI TERAPEUTICE

Picaturi Bach: Larch, Elm, Centaury, Rock Water

Cayce: masaje regulate cu ulei de masline si de alune, cu cateva picaturi de ulei de camfor

Bai calde, sauna, baie de aburi, lampa cu infrarosii

Perieri uscate

Bai de soare, eventual si solar pe zona respectiva.

Masaje cu uleiuri care sa stimuleze circulatia: rozmarin, maghiran, cimbru, coriandru, scortisoara, camfor

Acupunctura, masaje ale zonei cu reflexe

Comprese fierbinti cu piure de cartofi sau faina de mustar

Exfolieri (uscate), evtl. plasturi cu catel de frasin

Gimnastica medicala.

Miscare, dar nu exagerat.

Bronhiile

Tumori bronhiale (carcinom bronhial de tesut scuamos, carcinom bronhial ulcerat) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de teama teritoriala sau de spaima si soc (in functie de lateralitate, situatia hormonala si conflictele precedente).

EXPLICATIE: Ne temem sa nu ne pierdem teritoriul (partenerul, locul de munca) sau pozitia sociala in acel mediu (pozitie, rang etc.). In anumite situatii nu s-a intamplat inca nimic, dar "mirosim" pericolul iminent. Suntem extrem de nelinistiti, clopotele de alarma sunt din ce in mai puternice. „Am o frica de moarte“, „Tremur de frica“, „Fac pe mine de frica“.

Conflictul teritorial este reactia masculin-activa la amenintarea teritoriala.

Conflictul de spaima este reactia feminina-pasiva (barbatul reactioneaza prin atac, femeia prin inspaimantare pasiva).

EXEMPLE: pentru conflict de frica teritoriala

- O femeie are un sot, care o inseala des. Ea nu este sigura ca nu va fi inselata din nou. Conflict de frica teritoriala, cu pierdere de masa celulara in bronhii in faza activa. Vindecarea vine atunci cand ea se desparte de sot si cunoaste un nou barbat, care o iubeste cu adevarat. Cu acest nou partener

este sigura ca el nu o inseala. - refacerea mucoasei bronhiale = bronșita respectiv tumoare la nivelul bronhiilor.

- Capul familiei lucrează într-o mică firmă de instalații și mai are doi ani până la pensie. Cu șeful lui are o relație bună de prietenie. Într-o bună zi șeful decide să fuzioneze cu partenerul de afaceri. Noul co-proprietar nu-l poate suferi pe pacient. Relația devine din ce în ce mai proastă și pacientul se teme zilnic că o să fie concediat. Acest lucru ar fi foarte rău, deoarece are două fete de crescut și, pe de altă parte, la vârsta lui nu ar mai găsi un alt loc de muncă = Conflict de frică teritorială. Înainte de pensionare, deci doi ani mai târziu, se rezolvă frica de pierdere a locului de muncă. Omul începe să tusească și se gândește la o bronșită. Văzând că problemele nu se ameliorează, își face o radiografie la plămâni. Diagnosticul este „carcinom bronhial”. Din cauza diagnosticului, suferă un conflict de frică de moarte. Pacientul moare, după toate terapiile posibile. (*Claudio Trupiano – Multumim, doctor Hamer*).
- Deseori și amenințările de tip „teritoriu temporal”. De exemplu, cineva este sub presiunea timpului sau a unui termen, cuiva îi este „luat” timpul sau altcineva dispune asupra timpului său.
- Un stângaci (26 de ani) înființează împreună cu un prieten o mică firmă. Cu timpul se ajunge la certuri despre prezența în firmă. Pacientul vrea să-și savureze libertatea antreprenorială într-un program de lucru flexibil și orientat spre nevoi. Partenerul său vrea un program de lucru exact. = Conflict de teamă teritorială, care îi afectează laringele (stângaci). Când pacientul se desparte, după o ceartă, de partenerul de afaceri și poate să-și stabilească singur timpul de lucru, conflictul pare rezolvat. Din păcate rămâne o sînă: întotdeauna când apar termene scadente, private sau pe plan profesional, el reacționează cu același conflict de frică teritorială. După ce trece termenul, ziua următoare are laringele plin de puroi și o voce răgușită = fază de vindecare (*arhiva proprie*).
- O mamă (47 de ani) a doi copii are de 30 de ani o „prietenă bună” cu care se întâlnește de 2 ori pe săptămână. De o jumatate de an aceasta s-a retras brusc. După mai multe încercări zadarnice de a lua contact cu ea, dezamăgita, a încetat să mai încerce. = Conflict de teamă teritorială - prietenă dispăre din teritoriul meu. Intră în fază de vindecare atunci când prietenă o sună de ziua ei de naștere și discută cu ea. Acum poate să încheie problema și launtric. O săptămână mai târziu face pneumonie. Când antibioticele nu au avut efect, se face bronhoscopie și diagnosticul a fost carcinom bronhial (*arhiva proprie*).

TESUTURI AFECTATE: bronhiile, epiteliul scuamos, ectoderm

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: Pierdere de masă celulară (ulceratie) a mucoasei bronhiale - de multe ori neobservată. Zona afectată poate fi de la începutul traheei până în cele mai mici ramificații ale bronhiilor = diagnostic alopatic de „carcinom bronhial ulcerat”.

SENS BIOLOGIC: Prin reducerea numărului de celule se mărește diametrul. Prin aceasta se inspiră mai bine aer, pentru că teritoriul să fie aparat mai eficient.

FAZA DE VINDECARE: Refacerea mucoaselor bronhiilor și traheei - Inflamarea bronhiilor (bronșita), pneumonie, cancer bronhial: inflamare, roșeață, tuse, eventual scuipat sange, dureri. Inflamație puternică, cu tulburări de respirație în caz de sindrom. Datorită inflamației se poate opri fluxul respiratoriu într-un întreg sector al plămânului (atelectază pulmonară). Imediat ce inflamația scade, căile respiratorii se redeschid, adică atelectază dispăre. Bronșita durează mai mult prin recidive și sine.

CRIZA EPILEPTOIDA: Tuse, respectiv tuse convulsivă, din cauza participării musculaturii bronșice, frisoane.

OBSERVAȚIE: Cancerul bronhial este diagnosticat de obicei în fază de vindecare. Frecvent în legătură cu sindromul*.

TERAPIE: Conflictul este rezolvat. Se însoțește vindecarea. A se evita recidiva!

Preparate enzimatice, drenaje limfatice

Hildegard: rețeta specială - elixir de silnică (ground ivy)

Bronșita (inflamarea bronhiilor) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Acelasi conflict și program biologic ca mai sus.

FAZA DE VINDECARE: Reconstructia epitelului scuamos. Dureri, constrictia bronhiilor (stenoza) respectiv obturarea (atelectaza) datorita inflamatiei de vindecare, respiratie suieratoare (stridor). Expectoratii (sputa). Tusea = criza epileptoida a musculaturii bronsice. Tusea are sensul biologic ca mucozitatile sa fie eliminate.

OBSERVATII: La recidivarea conflictului, respectiv in faza de vindecare suspendata, se vorbeste in medicina alopata de „bronsita cronica hipertrofica“; la fel se poate diagnostica si carcinom bronsic in cazul in care se face o radiografie.

La reactivarea conflictului cu o faza activa lunga, diagnosticul alopata poate fi de „bronsita obstructiva cronica“ (deconstructia structurilor peretelui)

TERAPIA: Conflictul este rezolvat, se insoteste vindecarea, a se evita recidivele.

Inhalatii cu apa sarata sau ceai.

Ceaiuri: voronic, vatamatoare, nalba, ciubotica cucului, lumanarica, soc.

Remedii pentru plamani:

- exercitii regulate de respiratie, gimnastica
- ceaiuri: voronic, lumanarica, ace de pin, agrimony, salvie, patlagina, centaurea
- bai de soare
- Cayce: sirop de voronic
- Hildegard: lapte de capra

Bruxismul (scrasnitul dintilor) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Apare cand persoana ia prea in serios expresia "strange din dinti"!

CONFLICT: conflict de tip motoric: nu pot sa musc, nu pot sa mestec, trebuie sa ma impun dar nu pot sau nu am voie sa ma impun.

TEMA: incapatanare, incordare, fanatism.

EXEMPLU: un copil are diverse probleme la gradinita si nu poate "musca" inapoi, sa se apere. Noaptea intra in "vindecare" si in timpul epicrizei scrasneste din dinti.

TESUTURI IMPLICATE: muschiul maseter, muschiul temporal etc.; ectoderm (inervare) si mezoderm (nutritie)

FAZA: epicriza din cadrul fazei de vindecare > incordarea musculaturii masticale in faza vagotona de noapte; bruxism = "epilepsie a muschilor maseter"

TERAPIE: rezolvarea conflictului respectiv a recidivei/sinei, pt. ca vindecarea suspendata sa ia sfarsit.

GANDURI MOTIVATIONALE: "Nu trebuie sa ma prefac!", "Daca e nevoie, musc si eu!"

VIZUALIZARE: situatia sau persoana respectiva se afla in fata mea, iar eu de data asta "musc".

Inscenarea situatiei cu alte personaje si de data asta "musc" (merge la copii). Tot ce ma deranjeaza sau cu care nu sunt de acord trebuie verbalizat imediat, apoi se sterge din memorie.

Daca e posibil, ma impac dupa aceea cu situatia si cu persoana.

Picaturi Bach: Agrimony.

Gutiera de bruxism noaptea, pt. ca dintii sa nu fie vatamati cand se freaca unii de altii (se face la dentist).

Cancer al pielii, melanom melanom amelanotic, melanom nodular malign etc din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de "desfigurare", "murdarire"; a se simti murdarit, deformat sau atacat; violarea propriei integritati.

EXPLICATIE: rana concreta (lovitura, impingere, palma etc.) sau murdarire (mizerie, urina, fecale etc.) sau prin cuvinte. Conflict suferit frecvent la certuri, injurii sau diagnostice medicale.

TESUT AFECTAT: corium, derma, stratul mijlociu al pielii - mezoderm (cerebel).

FAZA ACTIVA A CONFLICTULUI: proliferare celulara locala in derma; creste un melanom.

SENS BIOLOGIC: intarirea dermei, pt. a fi mai bine protejat de murdarire, de "desfigurare" sau de violarea integritatii personale.

FAZA DE VINDECARE: deconstructie tuberculos-branzoasa cu ajutorul ciupercilor, al micobacteriilor sau al bacteriilor.

Cand melanomul uneori se rupe sau se sparge, se cheama "tuberculoza deschisa a pielii" - mai rar in ziua de azi, fiindca de cele mai multe ori melanoamele sunt operate imediat si fara necesitate, inclusiv cu tesut neafectat din jur.

OBSERVATIE: atentie la lateralitate (partea mama-copil sau partea partener)!

TERAPIE:

Aflarea si rezolvarea reala a conflictului sau a sinei, pe cat posibil, daca e conflict inca activ!

GANDURI: "Sunt puternic si protejat!", "Un meterez din cristal ma inconjoara", "Doar ceea ce este bun se poate apropia de mine!"

Picaturi Bach: Crab Apple

Operatie daca melanomul deranjeaza mecanic sau optic - intotdeauna excizie minima!

Se aplica miere de albine pe melanom.

De asemenea, vezi si remediile pentru piele (la "Psoriazis")

Cancer intestinal (adenocarcinom), polipi intestinali, ingrosarea tumorală a peretelui intestinal din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de "imbucatura", conflict de a nu putea digera ceva (adesea impreuna cu aspectul de infometare), conflict de a rata un castig dintr-un proiect etc.; "Am scapat ceva printre degete!"; "Am pierdut ceva asteptat!"

EXEMPLE:

- *Un bebelus este intarcat brusc si crede ca urmeaza sa moara de foame, intrucat piureurile de legume sunt inacceptabile.*
- *O secretara-sefa in varsta de 40 de ani ajunge intr-o situatie neplacuta, trebuie sa-si informeze seful ca o colega a tradat niste secrete de firma. Acum apare in fata colegilor ca o turnatoare = suparare nedigerabila. Dupa doua zile initiaza o discutie clarificatoare cu colega = rezolvare partiala a conflictului. Insa de fiecare data cand o vede pe colega respectiva, isi reaminteste intreaga poveste = sina. De atunci sufera de diaree si transpira noaptea = vindecare suspendata. Printr-o noua discutie cu colega, reuseste sa clarifice si sa limpezeasca total conflictul. (Arhiva proprie)*
- *Un barbat a avut un atac cerebral si nu mai poate vorbi. Nu se poate impaca deloc cu situatia. Inainte de atacul cerebral el era mereu in centrul atentiei si toti ii cereau sfaturile. Brusc, nu mai poate vorbi deloc = conflict de suparare nedigerabila > aparitia unei tumori intestinale in faza activa (medicina alopata = "tumoare maligna") (Arhiva proprie)*

TESUT AFECTAT: mucoasa intestinala, epiteliu cilindric, endoderm.

FAZA ACTIVA A CONFLICTULUI: cresterea functiilor intestinului; creste o tumoare de tip „conopida”, de calitate secretorie sau un adenocarcinom plat de calitate resorptiva. Tumorile de tip conopida pot provoca obstructii intestinale.

FAZA DE VINDECARE: deconstructie necrotizanta tuberculos-branzoasa cu ajutorul ciupercilor si al micobacteriilor. Febra, transpiratii nocturne, sangerari, diaree, eventual diaree si voma combinate, cand tumoarea se afla in jejun. Daca bacteriile lipsesc, tumoarea se incapsuleaza.

EPICRIZA: Frisoane, sangerari puternice (cu cheaguri eventual), spasme intestinale, colici datorita implicarii musculaturii intestinale

SENS BIOLOGIC: Proliferare celulara de calitate secretorie, pentru a produce mai mult suc digestiv, cu scopul de a digera mai repede „bucata” nedigerabila. Proliferare celulara de calitate resorptiva, pentru a putea asimila mai bine „imbucatura” (digestie mai buna).

TERAPIE: Aflarea conflictului, respectiv a sinelor, si rezolvarea lor reala, daca sunt inca active!

GANDURI: „Sunt in pace si armonie cu cei din jurul meu si cu toti ceilalti”, „Avem destul de mancat, o ducem

bine, nu ne lipseste nimic”.

Remedii pentru intestin:

- a nu se lua medicamente inutile
- ceaiuri: dioc (centaurea), turita-mare, fenicul, menta, coada soricelului
- mestecat f. bine, mancat cu placere
- bors, Kombucha, iaurt de casa
- Cayce: o migdala pe zi, bai de intestin (terapie hidrocolon) si eventual clisme
- comprese calde, cu apa sarata, pe burta
- cura de 7 zile de impachetare cu ulei de ricin: un servet de in 30x30cm se imbiba bine cu ulei de ricin, se pune pe partea dreapta, deasupra o bucata/fole de plastic si o buiota fierbinte. Se acopera cu o patura si se lasa o ora sa-si faca efectul. Dupa aceea se ia o doza mica de ulei de masline.
- cure de post - cea mai veche terapie la tulburarile de digestie. La post trebuie sa ne urmam instinctul si sa ne ascultam corpul, la fel ca animalele care postesc la boala. Nu se tine post sub presiune sau cu sentimentul unei obligatii, altfel declansam noi conflicte si noi simptome.
- Willfort: o cura de 3 saptamani cu suc de varza alba proaspat; jumătate pana la un litru pe zi.

Carii superficiale ale smaltului dentar din perspectiva NMG (Björn Eybl)

SARCINA DINTILOR

Incisivii: a musca, a prinde sau a-si arata dintii

Caninii: a apuca, a captura, a tine strans.

Premolarii: a mesteca.

Molarii primari si secundari: a macina.

CONFLICT: Nu putem sau nu avem voie sa muscam, nu putem sa ne aparam, nuanta conflictuala in functie de localizare.

TESUT: smaltul dentar – ectoderm (mucoasa oral-faringiana)

FAZA DE CONFLICT ACTIV: pierdere de masa celulara in smaltul dintilor (ulcerare). Aparitia cariilor = defect al smaltului, dureri.

SENS BIOLOGIC: Printr-o hipersensibilitate, sa se atenueze capacitatea de a musca; nu se mai poate musca din cauza durerilor.

FAZA DE VINDECARE: cf. dr. Hamer: refacere; sensibilitate la cald/rece sau dulce/acru; cf. stomatologilor NMG: nu mai exista refacere; gaura ramane sau se mareste daca nu se intervine cu plomba.

TERAPIE SUFLETEASCA: Pt. evitarea unor noi carii: analizarea potentialelor cauze sufletesti – rezolvarea reala a conflictului sau/si a sinei.

GANDURI: „Am dreptul sa ma apar”, „Nu ma mai las sicanat si pe viitor o sa <musc> si eu cand ma deranjeaza ceva”

ALTA STRATEGIE: A ierta in mod autentic si total.

GANDURI POZITIVE despre propria dantura. Ne imaginam cum dintii stralucesc de sanatate!

TERAPIE LOCALA:

Pus plomba; igiena dentara buna, pt. a evita alte carii; gargara si clatirea gurii cu ceai de salvie, de cui-soare, de mure, iarba de smirna; clatit gura indelung cu borax natural; xylitol.

Chisturi ovariene, tumori ovariene (carcinom ovarian) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Pierderea sau frica de pierdere a unei persoane apropiate sau animale.

EXEMPLE:

- Pierderea copilului, a sotului, a partenerului, a parintilor, prietenului sau a animalului preferat, prin moarte sau plecare de acasa.
- Un copil se muta departe, in alt oras, partenerul moare sau se instraineaza.
- O femeie de 26 de ani, dreptace, a fost diagnosticata cu ajutorul unei radiografii ca avand un chist la ovarul stang (partea mama-copil) de dimensiunea de 7 x 6 cm. Istoria conflictului: In urma cu 10 luni, pacienta aflase ca mama ei il insela pe tatal ei. Aceasta informatie i-a provocat pacientei un soc puternic, deoarece mama reprezenta idealul unei casatorii reusite. Ea sufera un conflict de pierdere, deoarece mama s-a indepartat sufleteste de ea. Cu 6 luni in urma, relatia se terminase si pacienta a putut sa-si ierte mama imediat. Relatia buna intre ele s-a restabilit si fiica are incredere ca mama nu va mai face asa ceva = Inceputul fazei de vindecare, cresterea chistului. Pacienta se decide, impotriva sfatului medicului ginecolog, sa lase chistul intact, ceea ce ar fi de folos in indeplinirea dorintei ei de a avea copii. (*arhiva proprie*).
- O pensionara de 70 de ani s-a imprietenit cu un barbatul pe care il admira foarte mult. La prima intalnire adevarata a celor doi, barbatul abia apuca s-o salute si sufera un atac cerebral = Conflict de pierdere, cu afectarea ovarul drept (partea de partener). In faza de vindecare se formeaza o tumoare ovariana de 700 g, conform medicinei alopate „o metastaza a intestinului gros“ (*arhiva proprie*).

TESUT AFECTAT: Tesut ovarian - strat medular, mezoderm

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: Reducere a masei celulare (necroze ovariene) = "gaurele" in membrana ovarului- de cele mai multe ori trecute cu vederea > scaderea nivelului de estrogen > menstruatie neregulata > oprirea temporara sau sangerare de intrerupere. La un conflict de pierdere inainte de pubertate, putem avea disparitia primei menstruatii.

FAZA DE VINDECARE: Reconstructie celulara, inflamatie ovarelor (anexita), inflamare, dureri. Din "gaurele" cresc acum una sau mai multe chisturi, care in timp se "impletesc" crescand impreuna cu tesutul functional = cancer ovarian > productie crescuta de estrogen. La inceputul fazei de vindecare, chistul creste practic lipit de organele vecine, lucru interpretat gresit de medicina alopata ca si "crestere invaziva". Aceste legaturi cu organele vecine se desprind de indata ce chistul si-a construit o vascularizare proprie, dupa 9 luni. Cel putin 9 luni trebuie asteptat cu o eventuala operatie de extirpare, daca ea este dorita.

SENS BIOLOGIC: tesut ovarian suplimentar (= tumoare) care sa produca mai mult estrogen > astfel femeia are un libido crescut, arata mai tanara si are ovulatii mai bune > sanse imbunatatite sa ramana insarcinata > "echivalarea" pierderii.

OBSERVATIE: Prin cantitatea marita de estrogen, un ovar o mentine tanara pe o femeie. Atentie si la lateralitate (mama-copil sau partener) sau daca este vorba de un conflict local.

TERAPIE: Conflictul este rezolvat, a se evita recidivele. Eventual operatie, daca chistul este prea mare si deranjeaza organele din jur.

Ciclu neregulat, amenoree, infertilitate, libido scazut din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CAUZE POSIBILE

- **Intoxicare/Otravire**, de ex. prin vaccinuri, radiatii, chimioterapie, substante modificate genetic etc.
- **Stare generala de simpaticotonie:** „Pofta” sau dorinta sexuala o au atat oamenii cat si animalele in stare de relaxare. Starea de stres este in directa opozitie cu starea benefica unei conceptii. Femeia care doreste sa conceapa un copil trebuie sa fie un monument de liniste. Barbatul reprezinta polul de activitate. Vanatorii stiu foarte bine ca de exemplu caprioarele pot ramane insarcinate doar atunci cand este liniste in padure. Prea multe strazi, biciclisti sau caini sunt factori care deranjeaza foarte mult conceptia.

- **Conflict feminin-sexual de pierdere teritoriala in faza activa:** > Un conflict teritorial pe partea stanga, „feminina”, blocheaza zonele teritoriale „feminine”. > „Femela” devine astfel „mascul” la nivel cerebral, deoarece se schimba lateralitatea, trecand pe partea dreapta. > masculinizare („dinamizare”, evtl. homosexualitate etc.) > scaderea nivelului de estrogen > disparitia ovulatiei (= amenoree secundara) > infertilitate. (vezi literatura dr. Hamer)
- **Hipofunctie ovariana - faza activa:** Pierdere de masa celulara in tesutul ovarian (necroza ovariana) > „gauri” in matricea de tesut conjunctiv, microrarea ovarului > scaderea nivelului de estrogen > cicluri neregulate, lipsa ciclului (= amenoree primara) > infertilitate, respectiv fertilitate scazuta.
- **Prea putina grasime in corp:** Estrogenul este produs si in tesutul adipos. Femeile supraponderale au, ca si barbatii, un nivel ridicat de estrogen. Cantitatea minima de grasime pe care trebuie s-o contina un corp pentru o sarcina este 24%. Sub 16% nu mai exista ovulatie.
- **Trompe uterine blocate:** aglutinari, constrictii, cicatrizari ale trompelor uterine datorita unor conflicte recidivante > infertilitate
- **Glanda pituitara - faza activa de conflict:** productie marita de prolactina

Cistita, inflamatie urinara din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict teritorial. Persoanei nu i s-au respectat limitele, persoana nu-si poate marca teritoriul, nu stie unde ii este locul/teritoriul, nu se poate delimita.

LATERALITATE:

- partea stanga: conflict de tip mama-copil
- partea dreapta: conflict cu partenerul, serviciul, restul aspectelor din viata

TESUT AFECTAT: epiteliul de tranzitie al mucoasei vezicii urinare - ectoderm

FAZA DE CONFLICT ACTIV: pierdere de masa celulara in tesutul vezicii urinare, in ureter sau uretra. In aceasta faza nu se observa dureri sau sangerari.

SENS BIOLOGIC: prin reducerea masei celulare al epiteliului de tranzitie se mareste capacitatea de retinere a vezicii respectiv sectiunea transversala la ureter, uretra > capacitate marita de stocare a urinei respectiv forta mai mare la urinare, pt. a marca teritoriul mai bine.

FAZA DE VINDECARE: reconstructie celulara = inflamatie a vezicii, uretrei sau ureterelor, uneori diagnosticata ca si "carcinom urotelial". Inflamarea tesutului, dureri, senzatii de usturime la urinare, polachisurie (nevoia de a urina des), evtl. sange in urina sau usoara incontinenta.

Prin inflamarea care apare la refacerea tesutului, fluxul de urina poate fi afectat, blocat.

Atentie la inrautatarea simptomelor cand apare "sindromul" (= alt conflict declansat de frica la primirea diagnosticului!!)

EPICRIZA: dureri, sange in urina, crampe ale musculaturii vezicii, evtl. frisoane, scurte perioade de "absence" (usoare spasme)

OBSERVATIE: 90% din asa-zisele tumori la vezica sunt carcinoame uretrale. Cistite cronice = recidiva de conflict > tesut ingrosat prin cicatrizare repetata (metaplazie scuamoasa uroteliala) > "vezica iritabila/hiperactiva"

TERAPIE: conflictul este rezolvat!! Se insoteste procesul de vindecare. Daca reapare, anamneza si rezolvarea conflictului sau a recidivelor!

GANDURI LA RECIDIVE: "Stiu ce vreau!", "Teritoriul meu imi apartine doar mie", "Eu stabilesc limitele si am grija sa fie respectate!"

Remedii pentru vezica:

- ceaiuri (salvie, fenicul, bradisor, musetel, coada calului, banutei, soparlita, frunze de stejar)
- in faza acuta: hidratare buna, evtl. consumat bere
- masaj in zona osului sacral, la sezut si coapse
- reflexoterapie

- acupunctura
- picioarele in permanenta calde
- bai fierbinti la picioare
- exercitii pentru bazin, pentru musculatura vezicii si pentru vitalitate. Aceasta zona este baza energiei vitale (chakra radacina).
- in caz de vindecare suspendata cu recidive si dureri puternice, se pot da antibiotice.

Ciuperca la picior / Panaritiu din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Panaritiul cf. NMG porneste de la un conflict la nivel de derma.

CONFLICT de tip "murdarire, desfigurare", "ne simtim atacati", se atenteaza la integritatea noastra etc.

EXPLICATIE: fie rana reala (lovitura, contuzie, palma) sau murdarire (murdarie, fecale, urina ca semn de marcare de teritoriu etc.) sau lovitura prin cuvinte; adesea la conflicte, controverse, discutii in contradictoriu, jigniri sau la diagnostice medicale.

TESUT AFECTAT: derma - cerebel- mezoderm.

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: intarirea si ingrosarea lojei unghiale sau a dermei piciorului.

SENS BIOLOGIC: intarire, pt. a bloca mai bine incercarile de murdarire sau atacurile de desfigurare (distrugere) percepute dinspre exterior (de la alti oameni, se intelege).

FAZA DE VINDECARE: deconstructie si descompunere branzoasa si cu puroi, cu ajutorul ciupercilor sau micobacteriilor = interpretata ca si "ciuperca la picior". Prin perceperea gresita a procesului de vindecare se intra pe recidive in care omul se simte si mai "desfigurata", si mai "murdarita" > risc de intrare intr-un cerc vicios pe viata!

TERAPIE: Conflictul este rezolvat. Se insoteste vindecarea. Se evita recidivele.

Se poarta pantofi deschisi in fata.

Comprese reci la degetele de la picioare.

Igiena buna a picioarelor, ingrijire speciala pt. picioare, ca sa ne simtim din nou confortabil cu propriile picioare, sa nu le mai percepem ca fiind "dezgustatoare" din cauza aspectului fizic > Ruperea cercului vicios. Argila.

Comprese cu branza de vaci.

Foi de varza alba batute ca sa se inmoaie si infasurate pe degetul afectat, apoi pus sosete.

Conjunctivita si blefarita din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict vizual de separare; a pierde pe cineva din ochi; a pierde contactul vizual cu cineva.

EXEMPLE:

- *Un copil este lasat la bunici pe timpul concediului parintilor = conflict vizual de separare; la doua zile dupa intoarcerea parintilor, copilul face conjunctivita (arhiva proprie).*
- *Partenerul pacientei dezvoltata brusc o pasiune pentru un hobby care pacientei nu ii place deloc = conflict vizual de separare = partenerul s-a indepartat de ea, ea l-a pierdut din ochi. Cand se obisnuieste cu noua situatie, femeia face conjunctivita = faza de vindecare (arhiva proprie).*
- *Pacientul, 49 de ani, casatorit, dreptaci, sufera de 3 saptamani de conjunctivita, cu simptome puternice.*
Istoria conflictului: in familia sa exista dintotdeauna o traditie, ca de ziua Allerseele (sarbatoarea sufletelor) toata familia sa se adune si sa sarbatoreasca. Din pacate, de 8 ani nu se mai intampla acest lucru = conflict vizual de separare. Cu trei saptamani inainte de declansarea simptomelor, are loc din nou o asemenea intalnire. Pacientul se bucura din tot sufletul sa-si vada toata familia = inceputul fazei de vindecare. Oftalmologul ii prescrie degeaba medicamente antivirale, in spital i se administreaza cortizon. Pacientul este usurat cand intelege legaturile sufletesti (arhiva proprie).
- *Un barbat de 55 de ani se intoarce din concediu si este obligat sa plece in delegatie. Ar vrea sa ramana acasa, la sotia lui, care are ameteli si dureri de cap si nu se simte bine. Pacientul sufera un*

conflict vizual de despartire. In ultima zi de delegatie i se umfla pleoapele atat de tare incat la intoarcere se duce direct la clinica de urgente oftalmologice = inceputul fazei de vindecare (arhiva proprie).

TESUT AFECTAT: membrana conjunctiva, epiderma - ectoderm.

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: ulcerare (pierdere de masa celulara) in conjunctiva sau in pleoapa. Insensibilitate la durere (hipoestezie), ochi uscaci, coji. Aceste simptome de obicei nu sunt remarcate.

SENS BIOLOGIC: Cel pe care l-am pierdut din vedere sa fie temporar uitat, prin diminuarea sensibilitatii in zona ochilor.

FAZA DE VINDECARE: Conjunctivita, inflamarea pleoapelor. Reconstructia tesutului, dureri, inflamare, inrosire, mancarimi - practic, un „carcinom al epiteliului scuamos”.

OBSERVATIE: Conjunctiva se poate inflama si prin iritatiei mecanice sau datorita expunerii la un soare prea puternic sau datorita unei uscaciuni masive a ochilor = reactie de adaptare.

Atentie la lateralitate (stanga = mama/copil, dreapta = partener) sau in caz de conflict local!

Conjunctiva „alergica” este de fapt repornita printr-o sina. O persoana care si-a pierdut primavara iubitul sau iubita = „febra fanului” sau „alergie” la polen etc.

TERAPIE: Conflictul este rezolvat, se insoteste faza de vindecare, a se evita recidivele.

Comprese reci, comprese si bai ale ochilor cu zeama de floare de ochi sau de coada calului.

MMS intern. Argint coloidal intern sau picurat in ochi.

A se evita soarele si vantul.

Drenaje limfatice, saruri Schüssler: 3, 4, 11. Vitamina D3.

Se bea bors. Hildegard: reteta speciala.

Doar in cazuri extreme, picaturi antibacteriene, cand faza de vindecare decurge prea dureros.

Diareea din perspectiva NMG (Björn Eybl)

FUNCTIA BIOLOGICA A DIAREEI: dezintoxicare, eliminare de toxine

CAUZE POSIBILE:

Intoxicare - alimente stricate, contaminate, aspartam, efecte adverse de la medicamente (in special antibiotice), calmante etc.

Alimentatie gresita: combinarea gresita a alimentelor poate duce la diaree.

MUSCULATURA INTESTINULUI: cand o "bucata nedigerabila" a unui conflict de suparare este blocata in intestin, se pornesc de obicei doua programe biologice speciale: un program de natura secretorie ("tumoare" de tip conopida), pentru a digera si dizolva bucata respectiva, si un program de natura motorica (peristaltica), pentru a "arunca" afara bucata nedigerabila (conflictul consta in imposibilitatea de a scapa de acea "bucata de suparare").

Diareea apare in epicriza din faza de vindecare sau cand avem vindecare suspendata (recidive), vezi Morbus Crohn, vezi inflamare in intestin, colite etc.

Simpaticotonie, in general: in faza activa de conflict, se deschid muschii anali si cei ai vezicii urinare, pentru a pregati aruncarea balastului, muschii stomacului se deschid pentru a usura trecerea.

Persoanele slabe, suple, sunt preponderent simpaticotone, adica sunt preponderent in faze simpaticotone, in stres. Le lipseste linistea interioara, relaxarea, nu se depune grasimea (tipul athletic sau leptozom/longilin, dupa Kretschmer); acest gen de oameni au tendinta -mai grosolan spus- de a se "caca pe ei" cand dau de greu > scaun moale, diaree.

La extrema cealalta ar fi cei comozi (vago-toni), cei cu un metabolism eficient dar care tind spre constipatie.

FICAT-BILA: conflict recidiv. Acest tip de diaree il au cei care nu prea pot digera grasimile.

Poate fi afectat tesutul renal entodermal sau canalul coledoc. Printr-o productie redusa de fiere, nu se mai digera grasimile > scaun de tip "piure", plin de grasime, care pluteste in apa. E legat si de un conflict de infometare combinat cu un conflict existential sau de un conflict teritorial combinat cu un conflict de identitate.

PANCREAS (MAI RAR): conflict recidiv. Dupa inflamari repetate ale pancreasului, glandele degeneraza; incep sa lipseasca enzimele necesare pt. digestia proteinelor, a grasimilor si a amidonului > scaun deschis la

culoare, de tip "piure", urat mirositor, care pluteste in apa.

CONFLICT: suparare cu membrii familiei, lupta pt. o "imbucatura", conflicte legate de o mostenire etc. Tiroida (rar): hormonul tiroidian tiroxina da simpaticotonie; accelereaza metabolismul si stimuleaza golirea intestinului. Diareea apare aici in faza activa de conflict.

CONFLICTUL: nu prindem o bucata sau nu putem scapa de o bucata, deoarece suntem prea lenti.

TERAPIE LA DIAREE: in functie de cauza respectiva.

- miscari de focusare de tip tai-chi sau antrenament pt. muschi
- nutritie: afine, orz, ovaz, miere- ceaiuri: frunze de mure, coaja de stejar, musetel, cicoare.

Pentru intestinul in faza de vindecare:

- a nu se lua medicamente decat daca este absolut necesar.
- Ceaiuri: centaur, turita mare, fenicul, menta, coada soricelului.
- mestecat indelungat, gustat pe indelete mancarea.
- ingrijirea simbiotilor bacterieni cu Kombucha, bors, iaurt de casa.
- Cayce: o migdala pe zi, terapie hidrocolon (bai intestinale) si clisme pt. dezintoxicare.
- Hildegard von Bingen: condimente gen seminte de fenicul, menta.
- comprese calde cu sare de mare pe burta.
- tinut post (cea mai veche si mai eficienta terapie pt. tulburarile de digestie).

Aici trebuie sa ne ascultam instinctul si intuitia, asa cum fac si animalele cand sunt bolnave; parintii sa nu se ingrijoreze cand copilul nu vrea sa manance.

Willfort: o cura de 3 saptamani cu suc proaspat de varza alba (0,5-1l pe zi)

NOTA BENE: a nu se tine post in mod impus si in conditii de stres, altfel se declanseaza alte conflicte!

Emfizem pulmonar (pierdere de tesut alveolar) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: spaima, frica de moarte (in sens de spaima puternica), frica de procesul mortii sau de decesul in sine

La emfizemul pulmonar, schimburile de gaze respiratorii sunt reduse, motiv pentru care se ajunge la dispnee (greutate in respiratie, cronica) si lipsa de oxigen in tesuturi (hipoxie).

FAZA: Conflict in recidiva - Situatii dupa multe faze de vindecare (datorita recidivarii conflictului si reactivarii programului biologic): cand sunt descompuse masele conflictuale de la plamani, raman niste caverne (vizibile pe radiografii ca „umbre circulare”). La emfizem pulmonar avansat, tot mai multe alveole isi pierd functionalitatea.

TERAPIE: Aflarea conflictului, respectiv a sinelor, si rezolvarea, pentru ca programul biologic special sa se incheie, sa nu mai fie necesar!

Ganduri: „Sunt in siguranta”, „Nu mai e niciun pericol”, „Sunt in siguranta in mainile lui Dumnezeu”.

Exercitii de respiratie, gimnastica, yoga.

Hildegard: ceai de mierea-ursului (pulmonaria obscura); se fierbe planta, se lasa in apa si apoi se bea cateva zile pe stomacul gol.

Epilepsia din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de tip motoric A fi paralizat de frica. Conflict de a nu putea sau a nu vrea sa te misti.

Pentru cazuri cu convulsii spontane repetate, cu sau fara pierderea cunostintei, medicina alopata diagnosticheaza „epilepsie”.

EXEMPLE:

- *O femeie austriaca de 30 de ani sufera urmatorele conflict motoric: se da cu sania pe deal si observa ca aluneca prea repede; dupa cateva minute se prabuseste cu sania intr-un parau inghetat si isi rupe doua coaste. Dupa impact, e convinsa ca a paralizat, intrucat pentru un scurt timp nu se poate misca. = conflict motoric, de a nu fi putut frana si de a nu se mai putea misca. Cateva zile mai tarziu pacienta sufera un atac epileptic cu pierdere de urina si absenta (pierdere scurta a cunostintei). Cu*

cateva ore inainte de acest atac avusese o criza de plans puternica. Dupa criza epileptica se simte din nou usurata si vede totul clar (www.gnm-forum.eu/board)

- *Un om urca pe munte si are indoieli daca va reusi sa ajunga in varf. Nu poate tine pasul cu ceilalti. = conflict motoric de a nu putea tine pasul, de a nu se misca suficient de rapid. Cand ajunge pe varful muntelui, are un atac epileptic. Atacurile se repeta intotdeauna in aceeași situatie. Cand urca intra in faza de conflict activ (incepe paralizia picioarelor, neobservata), in varf conflictul se rezolva si apoi apare criza epileptoida (arhiva proprie).*
- *Un baiat este nascut prematur si orb. Cand vrea sa exploreze mediul inconjurator, sufera conflicte motorice dupa altul, deoarece se loveste mereu de obiecte si cade. In fazele de regenerare apare mereu si criza epileptica (arhiva proprie).*
- *Un copil vede ca doctorul se apropie de el cu seringa (vaccin sau luat sange). Vrea sa fuga, dar mama il tine strans. = conflict motoric, de a nu putea sa fuga, de a nu putea sa scape de atacul seringii. > crize epileptice in fazele de rezolvare („vatamare postvaccinala” datorata conflictului motoric). Observatie: halatul alb al medicului, acul seringii sau chiar mirosul cabinetului pot ramane ca sine. Pe langa pierderea increderii, insasi mama poate deveni o sina care sa reactiveze conflictul motoric, ea fiind cea care l-a tinut pe copil.*

FAZA: criza epileptoida = atac epileptic. - In principiu o crampa musculara mai mult sau mai putin generalizata (crampa musculara a intregului organism). Crampele musculare si crizele epileptice se intampla DOAR in faza de liniste, de vagotonie. In timpul crizei, pacientul retraieste conflictul cu acceleratorul.

OBSERVATIE: Ipoteza medicinei alopate, ca la fiecare criza epileptica ar muri neuronii, este falsa. Grupele de muschi afectate cel mai puternic arata intotdeauna locul conflictului.

TERAPIE: Aflarea conflictului si rezolvarea lui in mod real. Cand crizele se repeta, trebuie cautate situatiile de recidiva sau sinele (de ex. si vise sau amintiri).

Ganduri: „Pot sa fac tot ce vreau, nu trebuie sa fac nimic din ce nu vreau”, „Sunt liber”, „Cu ajutorul lui Dumnezeu ma eliberez de toate constrangerile”.

Dans, yoga

Hildegard: pietre de agata si crisopras purtate aproape de corp; pus pietre de agata in apa de baut

Bai de picioare cu clorura de magneziu.

Complex de vitamina B

Vitamina D

Ulei de canepa

Antiepilepticele alopate sunt recomandate doar atunci cand nu se rezolva deloc conflictul; sa se incerce mereu scoaterea de pe antiepileptice, caci uneori se va constata ca ele nu mai sunt necesare.

Epistaxis (sangerare nazala) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CAUZE:

- tendinta de a sangera in faza de vindecare (mai ales in epicriza) dupa un conflict de "ceva imi pute" sau de "nu am putut adulmeca ceva";

- numar redus de trombocite (trombocitopenie) printr-un program biologic special al splinei: conflict de sangerare - faza activa > coagulare intarziata;

- la sangerare mai puternica: la inceputul fazei de vindecare a unui conflict de devalorizare de sine, sangele este mai subtire, din cauza deschiderii vaselor de sange si din cauza numarului (inca) redus de hematii (valoarea hematocritului) si asta duce la coagulare intarziata si tendinta de a sangera din nas.

TERAPIE: in functie de cauza specifica

LA SANGERARE: tinut capul usor inclinat in fata, tinut nasul inchis cu degetele 10 minute, pus ceva rece pe ceafa.

Hildegard: reteta speciala cu marar si praf de coada soricelului.

Flebta, tromboflebita, vene inflamate din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de devalorizare de tip "piatra de gat" sau "ceva ma trage in jos"

EXPLICATIE: Limitarea libertatii personale; purtam cu noi mult balast

TESUT AFECTAT: Vene - peretele venal - mezoderm-strat medular

FAZA DE CONFLICT ACTIV: Necroza (pierdere de masa celulara) in peretele venos, de cele mai multe ori nebagata in seama

FAZA DE VINDECARE: Repararea si dilatarea peretelui venos prin proliferare celulara. Vene "fierbinti", inrosite, dureri, umflare = inflamatie venelor, flebita

EPICRIZA: dureri puternice, frisoane

SENS BIOLOGIC: intarirea peretelui venos

OBSERVATIE: La inflamatii puternice, adesea se diagnosticheaza in mod gresit o tromboflebita (coagulari sangvine intravasculare -tromboze- la nivelul venelor). In realitate este vorba de o inflamatie "normala" a venelor, insotita de sindrom* (vezi la final ce e sindromul).

Atentie si la lateralitate!

TERAPIE: Conflictul e rezolvat! Se insoteste vindecarea, se evita recidivele.

Ciorapi elastici compresivi, stat cu picioarele mai sus de nivelul inimii, exercitii de rotire a gleznei, miscare multa, mers pe varfuri, dusuri reci, inot in apa rece, drenaj limfatic, preparate enzimatice, saruri Schüssler 1 si 3, alimentatie bazica (in special hrisca).

Fibroadenom/Adenofibrom la san din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: la femei dreptace apare la sanul stang datorita unui conflict de suparare sau grija ref. la mama/copil.

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: proliferare celulara in tesutul mamar; crestere nodulara; cu cat conflictul este mai lung si mai intens, cu atat nodulii vor fi mai mari.

Daca se face biopsie in timpul cresterii nodulare, medicina alopata diagnosticheaza ceva "malign"; daca la microscop nu este gasita o rata de multiplicare peste medie (= conflict rezolvat), se diagnosticheaza "benign".

SENS BIOLOGIC: cu tesut mamar crescut se poate produce mai mult lapte; biologic, prin excesul de lapte matern copilul se poate insanatosi

FAZA DE VINDECARE: deconstructie branzos-tuberculoasa (daca mai sunt prezente in organism micobacteriile tuberculoase si nu au fost distruse de vaccinari). Resturile celulare vor fi transportate prin sistemul limfatic. In caz ca nu mai exista micobacterii, nodulul se incapsuleaza in final si este decuplat de la metabolism, ramane fara sa deranjeze mai departe. Desi nodulii nu mai cresc, exista o usoara inflamare la inceputul fazei de vindecare, datorita metabolismului crescut, daca intra la lucru micobacteriile: vascularizare, transpiratii noaptea, eventual usoare dureri sau febra etc. Abia in urmatoarea faza nodulul scade semnificativ. Daca conflictul a fost f.f.f. puternic sau a avut mai multe recidive, inflamatie poate fi mai serioasa.

ATENTIE: Fara panica!! Panica poate declansa noi conflicte!... (chiar distrugatoare si real ucigatoare !!!)

FAZA EPILEPTOIDA: Dureri ceva mai puternice/acute, frisoane etc.

TERAPIE:

Rezolvarea reala a conflictului, rezolvarea problemei care a declansat conflictul

Exercitii mentale, tehnici de eliberare emotionala: "Nu-ti face griji, traieste!", "Grijile mele nu folosesc nimanui", "Nu mai incerc sa controlez pe nimeni; natura stie ce e mai bine".

PT. SUSTINEREA VINDECARII:

Picaturi Bach: Red Chestnut, Chicory, Willow

Comprese cu ceai de fenicul, galbenele, musetel

Foi de varza "batute" bine ca sa fie mai moi, aplicate pe san

Sare Schüssler: nr. 3, 11, 12

Drenaj limfatic, masaje blande

Furuncul, furuncul antracoid (inflamarea complexului pilosebaceu) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Aceasta inflamare poate veni de la un program biologic special care implica dermul sau unul care implica hipodermul, ambele sunt posibile.

CONFLICT: conflict de murdarie/desfigurare sau conflict de devalorizare local, ref. la aspectul pielii.

EXEMPLU:

→ *O casierita care lucreaza intr-un supermarket are mereu furunculi pe fund si in partea interioara a coapselor. Datorita unei usoare incontinente, poarta permanent absorbante. In perioadele aglomerate, cu multi clienti, nu apuca sa-si schimbe absorbantele la timp. Prin aceasta se simte murdarita = conflict de murdarie/desfigurare. Faza de vindecare = furuncul (arhiva proprie).*

TESUT AFECTAT: foliculii - mezoderm (substanta alba) sau dermul

FAZA: Faza de vindecare

TERAPIE: Conflictul este rezolvat. Se insoteste vindecarea, se evita recidivele!

Remedii:

- comprese cu ceapa taiata
- eventual punctia usoara a varfului cu puroi pentru a reduce presiunea.
- comprese cu foi de varza alba
- comprese cu ceai: arnica, musetel, bradisor, schinduf, vatamotoare

Guta (hiperuricemie) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Cristale de acid uric depuse la nivelul articulatiilor provoaca inflamatii. Excesul de acid uric indica in NMG o implicare a tubilor colectorii renali. Conform dr. Hamer, guta este un fenomen rezultat din combinatia a doua programe biologice speciale aflate in faze diferite.

CONFLICT/FAZA: faza postconflictuala a unui conflict de autodevalorizare, in functie de localizarea respectiva + faza activa a unui conflict existential, „conflict de refugiat” (de abandon, „ca un peste pe uscat”) (tubii colectorii renali) = sindrom* (vezi si la finalul documentului)

TESUT: Oase, articulatii => mezoderm nou (substanta alba) + tubii colectorii renali => endoderm.

OBSERVATIE: Cresterea nivelului de acid uric are loc deoarece programul biologic special (PBS) al tubilor colectorii renali nu stocheaza numai apa, ci si proteine sub forma de acid uric. Stocarea de apa duce la dilatare/umflare, la dureri puternice = criza acuta de guta. A se tine cont de lateralitatea biologica sau de conflictele locale.

TERAPIE: Conflictul de autodevalorizare este rezolvat. Trebuie aflat si rezolvat conflictul existential. A se evita recidivele.

- alimentatie bazica
- multa miscare la aer liber
- sport unde se transpira
- sauna
- Hildegard: a se mesteca zilnic trei cuisoare, a se bea ceai de dioc
- vezi si unele remedii de la Artrita
- eventual medicamente alocate pentru cei care sunt prea comozi ca sa-si rezolve conflictele si sa-si schimbe viata.

HEMOROIZII din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Hemoroizii profunzi, abcese anale

CONFLICT: Conflict legat de o bucată pe care n-o putem elimina: furie nedigerată; nu putem scăpa de ceva neplăcut, de o „mizerie” etc.

TESUT AFECTAT: mucoasa intestinală subcutanată – entoderm.

FAZA: fază de vindecare. În fază activă crește de obicei neobservată o mică tumoră sub epitelul scuamos. Abia în fază de vindecare o observăm, când este împinsă afară. Dpdv alopatic = „hemoroid”, „abces anal”. Transpirații noaptea, uneori puroi, sange deschis la culoare.

OBSERVAȚIE: Febra și transpirațiile sunt criteriul principal prin care deosebim hemoroizii profunzi de cei superficiali.

TERAPIE: conflictul este rezolvat. Se însoțeste vindecarea. Vezi și mai jos, la remedii.

Hemoroizii superficiali

CONFLICT: Conflict de identitate; nu știm unde ne este locul; nu știm ce decizie să luăm. Nu știm cui partener să ne alăturăm. Sau conflict teritorial cu furie (în funcție de lateralitatea biologică, situația hormonală și conflictele precedente).

TESUT AFECTAT: mucoasa anală de suprafață – ectoderm.

FAZA ACTIVĂ: necrozarea epitelului scuamos, pierdere celulară = ulceratie. Eventual fisuri anale. Fără dureri, fără sangerări; eventual amorteala.

SENS BIOLOGIC: lărgirea orificiului anal, pentru o eliminare mai eficientă. În natură, fecalele și urina servesc pentru a marca teritoriul. Locul eliminării definește mediul de viață și locul individului. Prin cantitatea mare de fecale eliminate se poate identifica/marca mai bine locul/ poziția individului și astfel se accentuează identitatea. Marcarea cu fecale este „treapta superioară” marcării cu urină.

FAZA DE VINDECARE: refacere și reparare celulară; dureri; inflamație, sangerare cu sange deschis la culoare; dpdv alopatic = hemoroid; accentuare prin *sindrom* (vezi mai jos ce e sindromul)

CRIZA EPILEPTOIDĂ: sangerări puternice, eventual frisoane; dacă e afectată musculatura anală striată, se poate ajunge la crampe anale, spasme sfincteriene și defecație f. dureroasă (tenesmus). Observație: la acest PBS nu apar transpirațiile de noapte.

TERAPIE: aflarea conflictului sau a sinei și rezolvarea în mod real, dacă acel conflict inițial încă mai este activ.

GÂNDIRE: „Iau o hotărâre clară”, „Știu unde mi-e locul”

REMEDII pt. zona anală / hemoroizi

Ceaiuri și băi cu: schinduf, lemn de stejar, lumanariță, frunze de castane porcești, coada soricelului, patlagină.

Cayce: exerciții de gimnastică – ambele brațe deasupra capului, ridicat pe varfuri și întins tot corpul în sus, apoi coborât cu mâinile până aproape de podea (dimineața și seara câte 2-3 minute)

Săruri Schüssler: 1, 11.

Bors.

Salba pe baza de tataneasă sau propolis (uz extern)

Zeolit (uz intern)

Argint coloidal (uz intern și extern)

În caz f.f. grav și "cronic", operație (cu laser și doar la hemoroizi care nu mai sângerează)

Herpes, leziuni și afte la gura din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de separare implicând buzele, gura sau limba. A se simți despartit de cineva sau a dori o despartire. A nu putea să spunem ceva, a nu dori să spunem ceva, a nu avea voie să spunem ceva. A dori să retragem ceva ce am spus. A dori contact sau a evita orice contact (de pildă o atingere, sărut etc.). Același tip de conflict se aplică și la mâncare sau diete: a-și refuza anumite alimente etc.

EXEMPLE: "Mai bine mi-ăș fi muscat limba!", "Nu pot să spun nimic!", "Am făcut spume la gura încercând să conving pe cineva!", "Mi-am ars limba!" [afte]

EXEMPLE: "Nu vreau să mă pupe matusica" (copilul face herpes); Ne umflăm de mâncare și regretăm apoi" (regretarea contactului cu mâncarea, afectează buzele); soția realizează că și-a rănit sotul cu niște cuvinte

dure = conflict de a-i fi scapat pe gura ceva ce nu voia, la cateva zile apar bubitele la gura [**herpes**]

TESUT AFECTAT [afte]: epiteliu scuamos - ectoderm (mucoasa oral-faringiana)

TESUT AFECTAT [herpes]: epiteliul scuamos al buzelor - ectoderm

FAZA DE CONFLICT ACTIV (la afte): apar mai multe leziuni (afte). Cu cat dureaza conflictul mai mult, cu atat aceste afte se adancesc. Durerile apar in faza activa si in epicriza.

SENS BIOLOGIC: marirea cavitatii bucale, extinderea capacitatii bucale

FAZA DE VINDECARE (la afte): reconstructia epiteliului scuamos din cavitatea bucala, inflamare, umflare, inrosire.

FAZA DE VINDECARE (herpesul ESTE deja faza de vindecare): basici la gura, inflamare, coji, in general nedureroase.

EPICRIZA: dureri, sangerare

OBSERVATIE [afte]: Fazele active si de vindecare pot alterna rapid. Uneori sunt diagnosticate drept afte si micile inflamatii ale mucoasei bucale endodermale, caz in care avem dureri si halena fatida in faza de vindecare.

OBSERVATIE [herpes]: Dureri in faza de pierdere de masa celulara (ulceratie), deci inaintea aparitiei basicilor. Atentie la lateralitate (stanga = partea mama-copil, dreapta = partener, servicii, societate etc.).

TERAPIE [afte]: aflarea conflictului si/sau a sinelor si rezolvarea lor reala, pe cat posibil.

Ganduri de ghidare: "Sterg cu buretele ce am spus!", "In viitor spun imediat ce ma supara" etc.

Lavyl 32, gargara cu ceai de salvie, de copac de ceai, microorganisme efective (prof. dr. Teruo Higa).

TERAPIE [herpes]: Conflictul este rezolvat. Se insoteste vindecarea. La recidiva, rezolvarea conflictului. Ingrijirea buzelor, de ex. cu salba de propolis (care are efect de "sigilare").

HEPATITA din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict teritorial, conflict de furie sau conflict de identitate (depinde de lateralitatea biologica, de situatia hormonala -care se schimba la menopauza si andropauza- si de conflictele anterioare).

EXEMPLE:

1) ne infuriem fiindca nu ni se respecta teritoriul sau granitele (mai ales la copii sau adolescenti);

2) simtim agresiune, fie a noastra, fie a "atacatorului" care ne invadeaza granitele (mai ales la copii sau adolescenti);

3) probleme cu colegii sau cu membrii familiei, incalcari ale granitelor personale sau atacuri de la vecini etc.; cearta ref. la bani; ne infuriem pana "ne facem negri de furie" (necrozarea celulelor);

4) ne simtim provocati. Si tot asa, fiecare are perceptia lui proprie.

TESUT AFECTAT: ductele hepatice, vezica biliara - epiteliu scuamos - ectoderm

FAZA DE CONFLICT ACTIV: pierdere de masa celulara (ulceratie) in vezica biliara sau in ductele hepatice, intrahepatic sau extrahepatic; dureri suportabile (dureri laterale), ulceratia da dureri (cortex senzitiv).

SENS BIOLOGIC: largirea ductelor pt. marirea lumenului > fierea circula mai rapid si ajunge mai repede in duoden

FAZA DE VINDECARE: Refacerea epiteliului scuamos al ductelor hepatice si vezicii biliare prin metabolism accelerat. Repararea pierderii de substanta. = inflamatie biliara, cancer la ductele hepatice. Dilatare respectiv inflamatie a ductelor hepatice (colangita)

Fluxul bilei poate fi temporar blocat, ductele se pot infunda temporar (colestaza). Cand edema de vindecare blocheaza in intregime ductele, tensiunea determina refiltrarea fierei in ficat, moment in care se observa simptomele cunoscute sub denumirea de icter (hepatita A).

Exista "hepatite anicterice", adica nu esti galbejit, dar ai totusi inflamatie de tesut hepatic evidentiabila la o baterie de teste clinice simple (enzime hepatice mult crescute). Aici obstructia fluxului de bila se face in majoritate in ductele intra-hepatice!

CRIZA EPILEPTOIDA: dureri puternice, frisoane, colici biliare datorate implicarii musculaturii ductelor hepatice. Atentie la hipoglicemiile severe, care trebuie tinute sub supraveghere.

TERAPIE: conflictul este rezolvat; se insoteste vindecarea; se evita recidivele. Se elimina f.f. multa urina dupa criza epileptoida, cand organismul scapa de edeme.

Ganduri de ghidare: "Mi-a trecut furia; data viitoare nu ma mai enervez/supar/infurii"
Preparate enzimatice, saruri Schüssler 3, 4, 9.

REMEDII PENTRU FICAT (pt. sustinerea fazei de vindecare fara probleme suplimentare)

- renuntat la medicamente, alcool, tutun, droguri;
- mancat f. putin seara, pt. a evita (prin fermentarea in intestine) efectul de "posirca" in organism;
- combinat alimentele corect: de ex. a nu se combina amidonoasele (cereale, paine, cartofi) cu zaharul etc.;
- curatarea tractului biliar (vezi metoda Andreas Moritz);
- baut multa apa dimineata;
- picaturi Bach: Beech, Chicory, Gentian, Gorse, Willow;
- ceaiuri: fenicul, ciulini, papadie, rostopasca, untisor, coada soricelului, dracila, cicoare, pelin
- mirodenii: turmeric, fenicul, safran, rozmarin, ienupar
- metode dupa Hildegard von Bingen: miere de castane; bitter suedez
- masaj de segment: pe spate, pe partea dreapta a coloanei, in dreptul pieptului, lateral, acupunctura sau masaj acupunctur, masajul zonelor reflex din talpi
- impachetari fierbinti-umede la ficat

Icter neonatal din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de suparare teritoriala sau conflict de identitate (in functie de lateralitate, situatie hormonala si conflicte precedente).

La multi nou-nascuti apare in primele doua saptamani de viata o „ingalbenire” a pielii (icter neonatal). In medicina alopata, acest fenomen este considerat normal (cu exceptia cazurilor grave, de asa-zis „icter patologic”). Medicina alopata explica fenomenul astfel:

- *numar mare de hematii cu durata de viata scurta;*
- *imaturitate enzimatica a ficatului;*
- *albumina serica redusa la prematuri si legarea serica redusa de albumina a bilirubinei indirecte.*

Ar fi interesant de studiat cat de frecvent este icterul neonatal la popoarele care traiesc departe de societatile „moderne”.

Daca s-ar renunta la ecografiile si amniocentezele din sarcina, iar mama si copilul ar fi supusi la un stres redus, cu siguranta icterul neonatal ar aparea mult mai rar.

Ecografiile, din pacate atat de populare, sunt un mare risc pentru embrion, respectiv pentru fetus. Lichidul amniotic se incalzeste in urma ecografiei si face chiar bule de aer (cavitatie). Zgomot=pericol=panica. Unii fetusi depasesc aceste momente fara vatamari grave, in schimb al altii se declanseaza panica si astfel ei se imbolnavesc.

Din perspective NMG, icterul neonatal nu este normal, ci este consecinta unui conflict de suparare teritoriala al bebelusului in timpul sarcinii, respectiv in timpul nasterii.

EXEMPLE:

- fetusul se simte deranjat in teritoriul lui din cauza ecografiilor;
- fetusul simte in apropiere acul cu care se extrage lichid amniotic pentru amniocenteza; concomitent, simte frica mamei ca nu cumva sa existe vreun defect genetic;
- mama se loveste in timpul sarcinii in zona burtii;
- fetusul aude in timpul sarcinii cum se cearta parintii;
- nastere dificila;

FAZA: cand apar simptomele de icter, conflictul se afla in faza postconflictuala („vindecare”): inflamarea ductelor biliare cu blocare temporara -> cresterea bilirubinei in sange si ingalbenirea pielii.

TERAPIE: Conflictul este rezolvat, se insoteste vindecarea, se evita recidivele. Cea mai importanta „terapie”: bebelusul sa ramana permanent langa mama lui, nederanjat de nimeni, si sa simta armonie si iubire.

Inflamatiia la ochi (cu secretii etc.) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de tipul "nu reuesc sa vad ceva ce vreau sa vad" (ochiul drept) sau "nu pot sa ma eliberez de ceva deja vazut, care mi-e neplacut" (ochiul stang).

Simplificat: nu vedem ceva ce am dori sa vedem sau nu vrem sa mai vedem ceva care nu ne-a placut.

TESUT AFECTAT: glandele lacrimale - entodermul

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: proliferare celulara cu calitate secretorie

SENS BIOLOGIC: cu ajutorul a mai mult lichid lacrimal se poate asimila sau elimina mai bine acea "bucata" de impresie pe care fie vrem s-o vedem si nu reusim, fie vrem sa scapam de ea...

FAZA DE VINDECARE: inflamarea glandelor lacrimale, se necrozeaza tuberculos-branzos masa celulara suplimentara, de care nu mai e nevoie; curg "lacrimi de puroi"; evtl. dureri, febra, transpiratii nocturne.

TERAPIE: la inflamare, conflictul e rezolvat; se insoteste faza de vindecare; se evita recidivele de conflict; se pun comprese reci, eventual comprese cu branza de vaci; drenaj limfatic.

LARINGELE

Laringele este pozitionat la trecerea dinspre faringe spre trahee. Este alcatuit din cartilaje, din care unul iese in evidenta la gat, „marul lui Adam”.

Sarcinile laringelui:

1. Glutitia: cand inghitim, laringele inchide traheea si conduce astfel mancarea in esofag
2. Fonatia (scoaterea de sunete): Prin corzile vocale, laringele participa in mod esential la limbaj si fonatie.

Laringele si corzile vocale sunt captusite cu o tunica mucoasa (epiteliu scuamos), sub care se afla musculatura striata si cea neteda.

Laringele este un organ mic, dar din perspectiva celor 5 legi biologice este un organ important, caci conflictele manifestate la laringe intra in categoria conflictelor teritoriale.

Laringita, carcinom laringian din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de tip sperietura/frica, mutenie/amutire, sau conflict de tip frica teritoriala (in functie de lateralitate, situatie hormonala si conflicte precedente)

EXPLICATIE: Sperietura de la un zgomot brusc sau de la un pericol. A nu putea vorbi sau a nu putea striga suficient de tare (tipicul conflict cu profesori sau antrenori de fotbal)

„A se speria de moarte!”, „A incremeni de spaima!”, „Mi-au ramas cuvintele in gat!”

Conflictul de frica si sperietura este reactia feminin-pasiva la amenintare. Conflictul de frica teritoriala ar fi aici reactia masculin-activa (Masculul reactioneaza prin atac, femela prin spaima pasiva)

EXEMPLE: pentru conflictele de sperietura/frica, respectiv mutenie/amutire:

- Intr-o discutie, cineva vrea neaparat sa spuna ceva, dar nu apuca.
- Cineva este pus sub presiune enorma de timp sau cu termene-limita.
- O femeie insarcinata are un accident cu coliziune frontala, cauzat de ea insasi. Este catapultata afara din masina. Se panicheaza sa nu piarda copilul. = conflict de sperietura/frica. Pierdere celulara in faza activa, refacere in faza de vindecare = laringita (vezi Gisela Hompesch, *Cum m-am vindecat de cancer*, pag. 57)
- Cineva primeste la telefon o veste groaznica = conflict de sperietura/frica (*arhiva proprie*).
- Sotul unei pensionare stangace in varsta de 60 de ani sufera de mai multi ani de o afectiune cardiaca. In ultimele luni situatia se agraveaza. El solicita tot mai multe lucruri de la sotia sa, incarcand-o pe aceasta cu tot mai multe sarcini. Ea se simte agresata in propria libertate de catre sot, simte ca nu mai poate dispune de timpul ei = conflict de frica teritoriala. Problema este ca sotul

devine tot mai dependent de ingrijirea ei si nu se mai descurca singur - libertatea ei devine tot mai restransa. Cand sotul pleaca la o cura de sanatate de mai multe saptamani, pacienta intra (cel putin temporar) in faza de vindecare. > Inflamarea si ingustarea laringelui (*arhiva proprie*).

→ Cu 4 ani in urma, un antreprenor ii preda firma succesorului sau. Se retrage treptat, deoarece firma ii este inca f. importanta. Intr-o buna zi il contacteaza un amic de afaceri cu care el colaboreaza de 30 de ani, sa-l instiinteze ca va incheia colaborarea la sfarsitul anului. = conflict de sperietura/frica (laringe), conflict de demarcare teritoriala (vezica urinara) si conflict de imbucatura (intestin). Dupa 4 zile intra in faza de vindecare, fiindca a constientizat: "Nu mai e firma mea, nu e treaba ta, nu e vina ta, nu te mai agita degeaba!" (vezi www.germanische-heilkunde.at/index.php/erfahrungsberichte)

TESUT AFECTAT: Mucoasa laringelui - ectoderm

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: Depletie celulara a mucoasei de epiteliu scuamos in laringe sau la corzile vocale. - Vocea este eventual slabita sau schimbata. Faza activa decurge in cea mai mare parte fara simptome. Fara dureri.

SENS BIOLOGIC: Prin depletia celulara se mareste lumenul laringelui si astfel se poate respira mai bine.

FAZA DE VINDECARE: Refacerea mucoasei laringiene = inflamarea laringelui, respectiv cancer laringian: umflare, inrosire, dureri. Modificarea vocii, voce „sparta”, raguseala pana la incapacitatea de a mai vorbi. In caz de *sindrom* (conflict suplimentar!), inflamare masiva cu dificultati de respiratie. Tuse din cauza mancarimii de vindecare.

EPICRIZA: Atacuri de tuse cu implicarea musculaturii laringiene, dureri, senzatii de frig, eventual frisoane.

OBSERVATIE: Cancerul laringian este diagnosticat in faza de vindecare, de cele mai multe ori in combinatie cu un *sindrom*.

TERAPIE: Conflictul este rezolvat! Se insoteste vindecarea. In caz de recidiva, trebuie aflate si rezolvate conflictul, respectiv sinele.

GANDURI: „N-o sa-mi ia nimeni capul!”, „Ma relaxez si am incredere ca Dumnezeu ma duce unde trebuie!”, „Data viitoare spun in fata ce m-a deranjat!”

Plimbari in aer liber, la aer rece.

Comprese cu branza de vaci sau apa cu sare.

Ceaiuri: ceai de nalba, de afine, de plamanarica, ceai de salvie cu miere.

Saruri Schüssler: 3, 4, 8.

Hildegard: reteta speciala cu voronic, lumanarica si fenicul.

Menstruatie cu dureri, „sindrom premenstrual” din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Durerile la menstruatie pot avea mai multe cauze:

1. Program biologic special al musculaturii uterului, evtl. cuplat cu mucoasa uterului (endoderm): conflict de a fi ramas gravida impotriva propriei dorinte sau de a nu putea ramane gravida. Faza de vindecare, respectiv faza epileptoida: crampe, dureri.

2. Program biologic special al musculaturii colului uterin, evtl. cuplat cu mucoasa ectodermala a colului uterin: conflict de frustrare sexual feminin. In faza epileptoida: crampe, dureri.

Cel mai frecvent conflict: o fata a avut contacte sexuale si se teme foarte tare sa nu ramana insarcinata.

Dupa fiecare act sexual, chiar si cand se protejeaza, sau la fiecare ovulatie, intra pe sina si conflictul se reactiveaza. Cand simte ca ii vine ciclul, incepe faza de vindecare > dureri menstruale.

Conflictele de frustrare sexual-feminine pot porni si de la o respingere sexuala (perceputa sexual), si de la un abuz sexual sau pur si simplu de la un soc cu stres emotional legat de sexualitate.

Conflict de frustrare sexual-feminin poate fi la fetite in urma unor socuri conflictuale de tip "sa ma culc cu X sau nu? oare o sa ma respinga daca nu o fac?" etc.

TERAPIE:

Constientizarea si rezolvarea conflictului initial.

Completare Nina Soare:

„La multe femei cu parteneri nepotriviti le dispar peste noapte simptomele menstruale neplacute de indata

ce isi gasesc un partener "potrivit" (cu care pot face copii/familie/etc).

In cele mai multe cazuri sunt sine care declanseaza diversele simptome. Crampele sunt un simptom, sanii durerosi alt simptom, etc. si fiecare are un conflict separat sau o sina separata. Cele mai multe conflicte sunt suferite de fete chiar inainte de prima menstruatie."

REMEDII PENTRU UTER:

Evtl. hormoni naturali, de ex. cf. Lee, Platt, Lenard, Rimkus.

Tratamente cu namol (namolul contine o cantitate uimitoare de estrogeni naturali).

Caldura la burta si la picioare.

Remedii Bach: Crab apple, evtl. Holly

Ceaiuri: melisa, coada soricelului, cretisoara, tei, fenicul

Polen

Osteopatie, masaj, reflexoterapie

Neurodermita ("dermatita") din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Pe langa intoxicarea corpului cu substantele chimice din vaccinuri, neurodermita pleaca de la un **CONFLICT MASIV DE SEPARARE**.

TESUT AFECTAT: ectodermul.

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: pierdere de masa celulara, de multe ori neobservata; pielea devine uscata, aspra, palida, se oxigeneaza mai putin; sensibilitatea este redusa.

SENS BIOLOGIC (comandat de creier): prin "insensibilitate" se poate trece cu vederea sau reprima conflictul separarii...

FAZA DE VINDECARE: reparaturile pielii, accelerarea metabolismului, oxigenare, procese inflamatorii de refacere celulara, inrosire, mancarimi, eventual dureri; la bebelusi dermatita seboreica.

Conform medicinei alopate, abia acum se considera ca persoana este "bolnava", cand in realitate ea este in plin proces de vindecare a unui conflict!!

A nu se folosi creme cu componente chimice.

Cel mult, ca sustinere, se pot folosi bai bazice cu sare de mare (pt. osmoza), se pun pe zona inflamata foi de varza (batute inainte, sa fie moi), putin ulei de masline presat la rece, miere 100% naturala sau crema de galbenele de asemenea 100% naturala.

De asemenea, esential este aspectul care se adreseaza sufletului: atingere constanta intre mama si copil, sa-l poarte permanent lipit de ea, sa-i vorbeasca, de ex. sa-si ceara iertare pt. ca a nascut prin cezariana sau pt. ca nu a putut alpta etc., sa-l mangaie, sa se refaca legaturile pierdute prin acel conflict initial.

Neurofibrom („tumoare” neurologica) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Axonii si fibrele axonice ale sistemului nervos perifer sunt acoperite de tesuturi protectoare (teci de mielina), formate din celulele Schwann. Neurofibromul este o „excescenta” a invelisului de mielina (tesut conjunctiv).

CONFLICT: Conflict de atingere, respectiv de durere. Conflict legat de perceperea unei atingeri ca pe ceva dureros, neplacut sau nedorit.

EXPLICATIE: Cea mai intensa atingere este un atac dureros (lovitura, izbitura, cazatura etc.). Si durerile osoase pot declansa acest program biologic special. Ca aparare, organismul poate „deconecta” sensibilitatea periferă.

EXEMPLE:

- O femeie batuta de sotul ei.
- Cineva se loveste foarte puternic cu capul.
- Neurofibrom la coloana vertebrala: pensionarul in varsta de 66 de ani, casatorit, se trezeste cu dureri puternice in piept, noaptea, in vacanta de schi. Prin RMN este diagnosticat un neurofibrom cat o aluna intre vertebrele 7 si 8, care este scos intr-o operatie riscanta,

datorita durerilor insuportabile. Istoria conflictului: cu 2 ½ ani in urma, omul se cocotase intr-un mar ca sa curete un cuib de pasari, aflat la o inaltime de 3m; printr-un accident nefericit, aluneca si cade mai intai cu pieptul pe o ramura mai joasa a copacului si de acolo pe pamant. Astfel, trece prin „cele mai ingrozitoare dureri din viata lui” = conflict de durere. Timp de doua luni nu poate sa stea fara pastile impotriva durerii. = Faza activa de conflict - aparitia unui neurofibrom; cresterea unei protuberante la coloana. Dupa 2 ½ ani pacientul intra in faza de vindecare, incet-incet uita de conflict si se indeparteaza de locul accidentului. = Inceputul fazei de vagotonie, cu descompunerea neurofibromului > Inflamare, dureri > operatie (*arhiva proprie*)

TESUT AFECTAT: Tecile de mielina - mezoderm - cerebel

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: Ingrosarea tecilor de mielina in zona afectata prin inmultirea celulelor Schwann = neurofibrom. Ingrosarea stratului izolativ duce la reducerea sensibilitatii la durere (anesteziere). Aceasta faza de desensibilizare la durere este greu de diferentiat de amortirea din faza activa a unui conflict de separare.

SENS BIOLOGIC: Prin ingrosarea invelisurilor neuronilor se reduce intensitatea durerii sau a atingerii nedorite, se blocheaza durerea.

FAZA DE VINDECARE: Refacerea sensibilitatii, eventual o suprasensibilizare initiala. Neurofibroamele raman sau sunt descompuse cu ajutorul bacteriilor, caz in care raman doar asa-zisele chisturi epidermoide.

NEUROPATIE: Conform medicinei alopate, avem de-a face cu o boala neurologica. Conform NMG: spasme, paralizie = PBS (program biologic special) al musculaturii; amorteala, furnicaturi = PBS al epidermei.

TERAPIE: Aflarea conflictului sau a sinelor si rezolvarea lor reala, pe cat posibil, in caz ca sunt inca active!

GANDURI: „Ma apara o mantie protectoare, nu mai permit decat oamenilor si lucrurilor care imi fac bine sa se apropie de mine”

Ulei de sunatoare, bai de flori salbatice.

In caz de inflamatie: argila, comprese cu branza de vaci, cu foi de varza alba, cu argila. Drenaje limfatice.

Hildegard: ulei de violete.

Otita din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de tip »bucata/”imbucatura” mare«. Urechea dreapta: nu am primit o informatie dorita. Urechea stanga: nu am putut sa scapam de o informatie urata, nedorita, sau nu am reusit sa inregistram ceva periculos. Simplificat: Nu am auzit ceva ce ne-am dorit sa auzim sau nu dorim sa auzim ceva neplacut. Nu am primit o informatie dorita sau nu am putut sa scapam de o informatie nedorita. Nu am auzit ceva ce ar fi trebuit sa auzim ca sa ne putem apara de niste consecinte negative.

EXEMPLE:

- Un copil nu primeste cadou o jucarie foarte dorita.
- Un copil vrea sa auda vocea mamei, lucru imposibil la cresa/gradinita.
- Fetita de 9 ani a unei femei de 36 de ani, dreptace, este f. slaba la scoala. Intr-o zi, invatatoarea discuta cu mama fetitei si ii spune ca rezultatele acesteia la scoala lasa de dorit = conflict auditiv de tip „bucata” - mama ar fi dorit sa auda altceva, anume ca fata a facut progrese > otita la urechea dreapta (cea care preia informatia).
Rezolvarea conflictului: se intalneste cu o prietena care are 3 copii. Aceasta relateaza ca are aceleasi probleme la scoala copiilor ei. Are loc o conversatie profunda si vindecatoare, in care mama fetitei isi poate spune pasul si isi poate goli sufletul de povara. Dupa acea discutie apare otita.
- O femeie afla de la prietena ei ca prietenul ei a flirtat cu altcineva = conflict de a nu dori sa auda acea informatie. In faza de vindecare apare otita - in cazul de fata, afectata este urechea stanga

TESUT AFECTAT: mucoasa urechii - entodermul

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: cresterea functiei „celulelor auditive originare”, dezvoltarea unei asa-zise tumori plate (adenocarcinom) de calitate resorptiva sau a unei tumori de tip „conopida” (= polip auricular) de

calitate secretorie. Se inmultesc in urechea medie acele „celule auditive originare”.

SENS BIOLOGIC: preluarea mai buna a „bucatii informationale” sau respingerea acesteia, cu ajutorul mai multor celule

FAZA DE VINDECARE: normalizarea functiilor, tumoarea este dizolvata tuberculos-branzos cu ajutorul ciupercilor sau micobacteriilor = otita medie. Inflamare, dureri, eventual cu perforarea timpanului sau curbarea polipului spre canalul exterior al urechii, puroi, febra, transpiratii nocturne

EPICRIZA: frisoane, dureri puternice

OBSERVATIE: otitele repetate pot afecta ciocanul, nicovala si scarita si pot duce in timp la surzire.

TERAPIE: conflictul este rezolvat, se insoteste vindecarea! In caz de recidiva, trebuie aflate conflictul si sinele si rezolvate!

GANDURI: „In viata nu primim tot ce ne dorim!”, „Nu trebuie sa le am pe toate si nu trebuie sa aud tot!”

Drenaje limfatice

Se picura in ureche zeama de musetel cu pelin sau ulei de masline si se acopera cu vata.

Flori de lumanarica, inmuiate 4 saptamani in ulei de masline - se picura in ureche.

Comprese cu ceapa: se taie ceapa f. fin si se pune peste ureche, in tifon subtire.

Frunze de varza alba batute bine se pun peste ureche.

Preparate enzimatice.

Hildegard: reteta speciala de picaturi uleioase de vita de vie.

Pareza faciala (paralizia Bell) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict motoric de tipul „cineva isi bate joc de mine”, „cineva ma face de ras si ma ridiculizeaza.”

EXEMPLE:

- Cineva se „face de ras” in fata familiei, in cercul de prieteni sau fata de colegi.
- „Chiar iti bati joc de mine?”
- „la uita-te si la asta, cum arata”

TESUT AFECTAT: musculatura striata - ectoderm (controlul motoric), mezoderm (hrana)

FAZA: pareza poate fi faza activa a conflictului, musculatura fetei este paralizata. Cel mai frecvent simptom este atunci cand coltul gurii in partea afectata se duce in jos, frecvent impreuna cu modificarea mimicii.

SENS BIOLOGIC: prin blocarea mimicii persoana capata o „poker face”, nimeni nu-i mai poate „citi” gandurile si sentimentele, astfel „jocul” inca poate fi castigat. Lateralitatea biologica trebuie luata in considerare.

FAZA POSTCONFLICTUALA: Refacerea inervatiei nervilor faciali. Atentie: uneori pareza apare abia la inceputul fazei de rezolvare (deci al fazei postconflictuale) sau imediat dupa criza epileptoida a conflictului motoric, cand un edem cerebral ocupa prea mult loc si duce la comprimarea tesutului din jur (musculatura - mezoderm), ceea ce duce la stoparea functiilor motorice (diagnosticul incorect din medicina alopata fiind de „atac cerebral”).

CRIZA EPILEPTOIDA: zvacniri, pulsatii, crampe

TERAPIE: Conflictul este rezolvat, se insoteste vindecarea, se evita recidivele si frica!

Comprese cu branza de vaci, spalata fata cu multa apa rece. Comprese reci cu ceaiuri (ceai de musetel si de soc). Se da usor peste zona afectata cu ulei esential de lavanda diluat sau cu ulei esential de sunatoare.

Expunere la lumina albastra, drenaj limfatic bland, eventual tratament osteopat la baza gatului. Bai fierbinti la picioare. Ceaiuri de levantica si de menta, eventual preparate de vitamina B (pura), ulei de in.

Medicamentele alopate au foarte multe efecte adverse si nu sunt recomandate.

Completare de pe site-ul newmedicineonline.com:

Pareza faciala este un conflict biologic de insulta, de jena, o umilire, o ridiculare, a se simti demascata, expus, a fi pus la punct in mod batjocoritor etc.

Paralizia apare in faza activa de conflict. In criza epileptoida, apar zvacnirile in timp ce muschii faciali isi revin la normal. Lateralitatea este importanta. O pareza faciala pe partea stanga la o persoana dreapta

indica un conflict biologic legat de „mama-copil.”

Simptomele de paralizie Bell apar in criza epileptoida care are loc la jumatatea fazei postconflictuale.

Peritoneul din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Cavitatea abdominala este captusita in interior de peritoneu, care este compus in intregime din tesut de origine mezodermala.

Exista doua straturi:

Stratul extern (parietal) este atasat de peretele abdominal, pe care il captuseste, iar stratul interior (visceral) formeaza invelisul exterior al organelor.

Exista un lichid lubrifiant in spatiul subtire dintre cele doua foite, care permite organelor sa se miste.

Epiploonul mare (omentum maius) este un pliu in forma de sortulet al peritoneului, care este atasat de stomac si de colon si atarna pe deasupra intestinelor mici, spiralate.

El se poate misca individual, asa incat se poate pozitiona intentionat in jurul unor focare de inflamatie, pentru a le izola. De exemplu, el se pliaza in jurul unui apendice perforat si astfel impiedica continutul intestinului sa patrunda in cavitatea abdominala. Aceasta caracteristica a adus epiploonului porecla de „Glückshaube” (in germana, „boneta norocoasa”).

Cancer de peritoneu (cancer peritoneal, mezoteliom peritoneal, hiperplazie mezoteliala papilara) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT:

Conflict de atac impotriva cavitatii abdominale. Atac real, amenintare sau inchipuire a unui atac.

EXEMPLE:

→ Foarte adesea din cauza diagnosticelor brutale precum: „Am gasit acum metastaze si la ficat” sau „Aveti un cancer intestinal malign. Va trebui sa va operam indata.”

→ Cuvinte rele, violente, insultele sau abuzul verbal pot fi simtite ca lovituri sau lezari/rani.

→ Dureri abdominale intense, indiferent de cauza (colici, otraviri etc.), pot, de asemenea, sa fie resimtite ca si conflicte de atac > proliferare celulara in faza activa, descompunere celulara in faza de vindecare.

• O femeie de 69 de ani este diagnosticata cu o tumora la colon de 17 centimetri in diametru. Avand in vedere dimensiunea tumorii, femeia primeste un prognostic foarte grav = atac impotriva abdomenului.

(Pacienta se simte amenintata de tumora imensa din abdomenul ei). > crestere celulara in peritoneu = „cancer peritoneal”. Trei saptamani mai tarziu, dupa ce tumora este eliminata, chirurgii gasesc un numar de mezotelioame punctiforme. (Arhiva personala B. Eybl)

TESUT:

Peritoneu - cerebel - mezoderm.

CONFLICT ACTIV:

Proliferare celulara in peritoneu, crestere de mezotelioame mici sau plate, in functie de cum percepe persoana atacul, daca se simte atacata in intregul abdomen sau doar intr-un anumit loc.

SENS BIOLOGIC:

Consolidarea si ingrosarea peritoneului pentru a contracara mai bine atacurile.

FAZA DE VINDECARE:

Descompunere tuberculos-branzoasa impreuna cu febra, transpiratii nocturne, dureri puternice; sau incapsularea tumorii daca nu sunt disponibile bacteriile care s-o descompuna

Apare lichidul abdominal (ascita), in special cu *sindrom* [vezi la finalul documentului]. Dupa ce vindecarea este completa, pot ramane depozite de calciu si cicatrici.

CRIZA EPILEPTOIDA:

Frisoane, durere foarte intensa

TERAPIE:

Identificarea conflictului si/sau a sinelor si pe cat posibil rezolvarea in mod real, daca sunt inca active.

Intelegerea tuturor conexiunilor si a intregului context este foarte importanta aici.

GANDURI CALAUZITOARE: „Sunt in siguranta. Sunt protejat.”, „Totul va fi iar bine.” „Eu stiu cum stau lucrurile, deci acest diagnostic nu ma poate tulbura.”

In medicina alopata, „terapia” consta in operatii, chimioterapie si radiatii, care „promit” prelungirea vietii cu 3 luni. Imediat dupa interventia chirurgicala, de obicei cresc mezoteliomamele din nou, chiar in rana lasata de operatie. In opinia noastra (si „din perspectiva pleurei”), acest lucru este de inteles, pentru ca operatia reprezinta chiar ea un nou atac. > Din cauza sanselor de succes reduse, aceste terapii alopate nu sunt recomandate.

Inflamarea peritoneului (peritonita) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Medicina alopata distinge intre peritonita primara (sursa inflamatiei fiind peritoneul) si peritonita secundara (inflamatie vine de la organele din jur, de exemplu de la intestin). In caz de peritonita primara:

Acelasi conflict ca mai sus.

EXEMPLU:

• Un barbat dreptaci, in varsta de 3 de ani, sta pe scaunul pasagerului langa prietena lui care trece printr-o intersectie, avand verde la semafor. In acel moment, un vehicul care vine din partea dreapta izbeste masina pe partea pasagerului. Pacientul simte un impact lateral in abdomen. Airbag-ul lateral se deschide = conflict local de atac impotriva abdomenului. Omul este dus la spital cu ambulanta. 24 de ore dupa accident, are dureri puternice. Abdomenul este tare ca lemnul si foarte sensibil la apasare = peritonita.

Dupa 48 de ore de la accident (a doua zi in spital), abdomenul acestui pacient sportiv se umfla cat o minge si este foarte tare. Pacientul: „Ca si cum as fi fost insarcinat.” = faza de vindecare - ascita – efuziune peritoneala exsudativa. Burta ii ramane umflata inca doua zile, dupa care urineaza treptat lichidul, iar durerea ii dispare. (Arhiva personala B. Eybl)

FAZA:

FAZA DE VINDECARE: inflamarea peritoneului, descompunerea „tumorii” cu ajutorul bacterilor, febra, transpiratii nocturne. Peritonita acuta are un set de simptome grave: dureri abdominale, peritoneu „tare ca piatra”, incordare, durere acuta foarte puternica in criza epileptoida.

TERAPIE:

Conflictul este rezolvat. Se insoteste procesul de vindecare.

Inflamatie usoara: Comprese cu solutie salina 3-5% (30-50g sare la litrul de apa) sau impachetari cu branza de vaci, drenaj limfatic, preparate enzimatice, sare Schüssler: nr. 3.

La peritonita severa, generalizata, medicina alopata face urmatoarele: indepartarea chirurgicala a tesutului inflamati si a puroiului; apoi clatirea cavitatii abdominale (lavaj peritoneal). Ulterior, pacientul are nevoie de terapie intensiva: ventilatie artificiala, antibiotice, analgezice. Daca aceste masuri drastice chiar sunt necesare, nu va pot spune eu. Trebuie luate decizii individuale!

Ascita peritoneala (ascita exsudativa) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Prin ascita se intelege acumularea de lichid in cavitata peritoneala. Ascitele pot aparea in timpul inflamatiei (faza de vindecare) la oricare din organele abdominale, chiar si la oase, atunci cand exista si un *sindrom* [vezi definitie la finalul documentului] (= ascita transsudativa). O inflamare a ficatului poate duce la diagnosticul gresit de ascita.

Ascitele pronuntate apar intr-un program biologic al peritoneului + *sindrom* (= ascita exsudativa):

Acelasi conflict biologic ca mai sus, dar cu *sindrom*:

EXEMPLU:

• O pacienta este diagnosticata cu cancer la ficat si este fixata data interventiei chirurgicale = conflict local de „atac impotriva abdomenului”. Operatia se amana (din cauza unor analize) 4-6 saptamani. In timpul operatiei, abdomenul se dovedeste a fi „plin de metastaze” = proliferare celulara in peritoneu (mezoteliom peritoneal). Chirurgii incheie operatia, neputand sa faca nimic. Pacienta afla de cele 5 legi biologice ale naturii si isi rezolva conflictul de atac. Apare o ascita uriasa. (Cf. Dr. Hamer, Goldenes Buch Bd. 1, pag. 348).

• O pacienta de 55 de ani decide sa faca o operatie de liposuctie a abdomenului, din cauza ca sotul ei o critica mereu pentru ca avea burta grasa. Cand vede acele uriase infipte in abdomenul ei, se simte atacata.

= conflict local de atac impotriva abdomenului. I se dezvoltă mezoteliom exact în cele patru locuri prin care i se scoase grăsimea din abdomen. (Cf. Claudio Trupiano, „Multumim, Dr. Hamer”, pag. 207)

FAZA:

FAZA DE VINDECARE: Descompunerea mezoteliomului merge mână în mână cu producția de lichid. Scopul este de a preveni aderențele abdominale, din moment ce la ascită totul „înoată” > abdomen marit, cu luare în greutate, ascită severă în caz de *sindrom* [vezi definiția la finalul documentului].

TERAPIE:

Conflictul de atac este rezolvat. Se însoțește vindecarea, se evită recidivele. DAR: trebuie rezolvat conflictul refugiatului (care duce la sindrom).

Ceai: urzică, coada calului, splină, salvie. Se beau normale lichide, f. puțină sare (sare grunjoasă), fără carne de porc. Drenaj limfatic, băi cu apă sărată, preparate enzimatice. Exerciții de respirație vindecătoare conform prof. Tirala. Dacă este necesar: medicamente analgezice.

A se evita punctiile pe cât posibil, respectiv a se prelungi treptat intervalele între punctii. Pentru ascitele cronice, eventual implant de cateter auto-operat. Pentru tratarea pierderii mari de proteine datorate punctiilor > aport de proteine bogate, biologice, asimilabile, precum ouă, brânză de vaci, proteină 88; eventual perfuzii cu albumină.

Pojar, rubeola, varicela din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de separare, de atingere corporală, a dori contact fizic sau a nu dori contact fizic.

EXPLICATIE: Conflicte de separare de tip „vreau să am contact”: apare o despărțire fizică bruscă, se pierde contactul cu un om iubit sau un animal iubit. Persoana se simte abandonată, lăsată baltă, dezamăgită.

1) Conflicte de separare de tipul „nu vreau să pierd legătura”: se rupe contactul, se pierde legătura cu o persoană iubită, un animal drag. Ne simțim parasiti, abandonati, lasati baltă. Uneori conflictul este de tip „nu am observat un pericol, nu am putut simți/intui ceva”.

Conflictul ne afectează interiorul corpului (meridianele Yin): burta, stomacul, pieptul, partea interioară a brațelor și picioarelor, partea interioară cu care îmbrățișăm și ținem strâns ceva. Cu stomacul și pieptul ne lipim de cineva care ne este drag.

2) Conflicte de tipul „nu mai vreau să am contact”: cineva ne înghesuie, ni se bagă pe gat.

Conflictul ne afectează exteriorul corpului (meridianele Yang): spatele, fundul, partile exterioare ale brațelor și picioarelor, coatele, partea exterioară a încheieturilor și genunchilor. Cu coatele, pumnii, picioarele, genunchii ne putem apăra, putem respinge persoane nedorite.

Uneori, conflictul vine de la socol de a nu fi simțit un pericol, de a nu fi perceput ceva.

La pojar, rubeola sau varicela, avem un conflict de separare generalizat - a dori contact direct sau a nu dori contact direct.

EXEMPLE:

- *Elevii unei clase (sau grupe de grădiniță) își adoră învățătoarea (educatoarea). Brusc, în mijlocul anului, ea dispăre în concediu de maternitate. = conflict colectiv de separare. După ce copiii se obișnuiesc cu noua învățătoare (educatoare), întra colectiv în faza de vindecare > „pojar” ca faza de vindecare*
- *Multi copii sunt dați prea devreme la grădiniță. Ei și-ar dori să rămână acasă, la mama lor. După ce își găsesc acolo prieteni, iar pe educatoare o acceptă ca pe un fel de surrogat de mamă, capătă (colectiv sau nu) varicela sau pojar = faza de vindecare a conflictului de separare.*
- *Cei 3 copii ai unui cuplu, cu doar 2 ani diferență între ei, suferă din cauza rupturii contactului cu părinții, fiindcă sunt nevoiți să meargă la școală. În vacanță se bucură că vor putea rămâne acasă, unde să petreacă mult timp cu părinții. Toți trei dezvoltă varicela = faza de vindecare. (arhivă proprie)*

FAZA: Faza de vindecare: refacerea dermei sub forma unor mici pete roșii (asa-numitul „exantem rujeolic”), la varicela eventual cu mici vezicule.

OBSERVAȚIE: De ce se îmbolnăvesc mai mulți copii din aceeași familie sau din aceeași clasă concomitent?

Membrii unui grup de oameni traiesc si percep anumite situatii impreuna > se construiesc astfel un camp colectiv de perceptii si ganduri (*Rupert Sheldrake* - „*Camp morfogenetic*”). cu cat grupul este mai omogen, cu atat membrii lui vor avea traieri mai asemanatoare. Perceptii asemanatoare duc la conflicte asemanatoare.

In prezent nu mai exista, ca in trecut, „epidemie” de pojar deoarece familiile si grupele de oameni sunt tot mai mici (asa-zisa „individualizare”).

De cele mai multe ori, intra in vindecare mai multe organe cu aceeasi cauza conflictuala > avem inflamatii in gat, in nas, conjunctivita sau inflamarea ganglionilor limfatici

„Puseu de crestere” sau „saltul de dezvoltare” la copiii care au trecut printr-o boala a copilariei nu vine prin boala insasi, cum se afirma de obicei, ci se intampla dinainte. „Puseu de crestere” = „solutionarea conflictului” = startul fazei de vindecare. Si noi, adultii, trecem printr-un „puseu de maturizare” inainte de a dezvolta simptomele pe care le numim „boala”!

A nu se confunda acest puseu de maturizare cu ceea ce a descoperit dr. Hamer ca fiind un „stop de maturizare” la conflictele teritoriale. Conflictele de separare care afecteaza pielea nu tin de conflictele teritoriale si deci nu cauzeaza niciun blocaj de maturizare.

TERAPIE: conflictul este rezolvat, se insoteste vindecarea, se evita recidivele!

Vezi remediile pentru piele (la Psoriazis).

Pojarul din perspectiva NMG (Richard Schepmann)

Simptomele la nivel de epiderma ale pojarului reprezinta *un conflict de separare rezolvat*. Acest conflict se manifesta in mod "normal" numai in anumite zone ale corpului. La copii (si la oamenii batrani), conflictele sunt traite adesea in mod generalizat, de aceea simptomele (in acest caz eruptia cutanata) apar aproape pe tot corpul.

Daca se pune eticheta de "pojar alb", inseamna ca nu a existat un conflict de separare si diagnosticul oricum e gresit.

Daca avem un simptom de *conjunctivita*, conflictul rezolvat este de *separare vizuala* (cineva fusese "pierdut din vedere").

Daca mai avem o *rinita la care curge nasul*, inseamna ca tocmai s-a rezolvat un *conflict de "adulmecare", ceva care "ne putea", ceva pe care nu-l puteam "mirosi"...*

Cand caile respiratorii sunt inflamate masiv, aici reactioneaza si tubii colectorii renali (conflictul fiind descris ca "sentiment de abandon total", "senzatie de copil fara mama"), astfel se ajunge in faza activa a conflictului la resorbtiia masiva a apei in tesutul adipos, care duce la edeme diverse, pentru ca in faza de rezolvare sa se elimine lichidul pe toate caile posibile.

Daca apare o *bronsita* ca simptom, a fost vorba de un *conflict teritorial* sau un *soc conflictual cu sperietura mare*.

Pentru cine este familiarizat cu decodificarea simptomelor in functie de medicina germanica, este clar ca perceptiile individuale sunt atat de diferite, incat aceleasi situatii pot fi receptionate emotional complet diferit, ceea ce duce la simptomatologia variata. De aceea trebuie privit intotdeauna cazul individual si nu doar "pojarul" ca simpla "eticheta pe borcan".

"Poliartrita reumatoida" din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Din perspectiva alopata, reumatismul este o asa-zisa boala autoimuna. Celulele proprii organismului ar incepe brusc si fara explicatii solide sa-si atace propriile tesuturi si sa le distruga. Factorii indicatori sunt asa-zisii "factorii reumatoizi", plus viteza marita de sedimentare a hematiilor. La "factorii" reumatoizi intra din perspectiva alopata "anticorpii", care ar lucra impotriva tesuturilor proprii. Metodele de testare sunt cea de aglutinare si nefelometria (vezi si testele Waaler-Rose sau ELISA).

In NMG, toate aceste valori de laborator nu au nicio semnificatie.

In conceptul de "anticorpi" este integrata o mentalitate de lupta intre "bine" si "rau" - din aceasta mentalitate neodarwinista depasita s-au nascut termeni gen "imuno"globuline, "anticorpi", "antigene". In realitate, in corpul uman nu au putut si nu pot fi observate nicaieri procese care sa duca la concluzia ca

acolo ar avea loc vreo lupta.

Notiunea de "sistem imunitar" nu este folosita in NMG, deoarece asa ceva nu exista. De asemenea, nu exista "imuno"globuline, "anticorpi" sau "antigene". Corect ar trebui sa vorbim despre globuline. Aceste globuline apar in numar mai mare in organism doar ca si consecinta a unor otraviri celulare (vaccinuri, antibiotice, droguri, alcool), ca reactie la raniri (contuzii, luxatii etc.) sau in perioadele vagotone de vindecare.

CONFLICT: Conflict de devalorizare

TESUT AFECTAT: tesutul osos, cartilagiile, muschii - strat medular - mezoderm

FAZA: "faza acuta" = faza de vindecare; faza fara simptome = faza de conflict activa. La fiecare inflamare prolifereaza si mai multe celule > cartilagiul respectiv se ingroasa si mai mult si se deformeaza si mai tare.

OBSERVATIE: atentie la lateralitate!

TERAPIE: rezolvarea conflictului si a sinelor, pentru ca programul biologic special sa se incheie. Intelegerea ca "reumatismul" nu este o imbolnavire cronica fatidica, ci este o suma de simptome care pleaca tot din psihic.

GANDURI POZITIVE: "Nu mai iau lucrurile in tragic!", „Renunt la pretentii absurde!“, „Gata cu perfectionismul!“, „Am incredere in mine insumi!“


MASURI TERAPEUTICE IN FAZE ACUTE: vezi la Artrita.

PROSTATA

Prostata este un organ musculo-glandular, se afla la baza in raport direct cu colul vezicii urinare si alcatuieste un complex de musculatura si glande entodermale, care formeaza secretii prostatice alcaline. Prostata e strabatuta printre altele de uretra prostatica si canalele ejaculatoare. Ductele prostatice ectodermale, captusite cu epiteliu de tranzitie (uroteliu) transporta secretiile prostatei de la glandele prostatice la uretra.

Sperma consta pana la 40% din secretia prostatei. La ejaculare, sperma este amestecata cu secretiile prostatei si eliminata cu ajutorul musculaturii netede, trecand prin uretra.

Secretiile prostatei determina ca sperma sa aiba acel miros tipic de mosc si flori de castan. Mirosul de mosc este afrodisiac.



Prostata, marea prostatei (hiperplazie), cancer la prostata (adenocarcinom) din perspectiva NMG (Björn Eybl) - conflict al tesutului prostatic

CONFLICT: Conflict sexual. Cineva nu poate sau nu vrea sa aiba copii. Cineva nu se (mai) simte suficient de masculin/potent. Cineva are indoilei referitoare la capacitatea de erectie, respectiv la "barbatia" lui. De obicei intalnim acest conflict la barbatii mai in varsta, care nu mai reactioneaza cu conflicte teritoriale (Dr. Hamer: "conflict genital urat")

EXEMPLE:

- *Un barbat care vrea, dar nu mai poate (probleme de potentia) sau un barbat care vrea, dar nu are voie (sotia nu mai vrea sau nu mai vrea asa des sau isi doreste pe altcineva).*
- *In timpul unui divort, pacientul face cunostinta cu o tanara femeie, care ii ofera totul pe plan sexual. In timpul procesului pacientul isi da seama ca acea femeie ii transmitea avocatului sotiei lui informatii importante. - Ea l-a tradat. = **conflict sexual**.
In faza activa, creste valoarea de PSA („antigen specific prostatic”) la 4. Desi pacientul nu are niciun fel de simptome, se face punctie „de proba”. Abia la a doua biopsie i se gasesc niste celule in crestere si imediat e diagnosticat cu cancer. Dupa scoaterea prostatei, pacientul este impotent si partial incontinent. Cand i se mai recomanda si chimioterapie, pacientul incepe sa caute alternative si gaseste cele 5 legi biologice.
Impotentia ii declanseaza insa un si mai mare conflict sexual. > Proliferare celulara la sfincter > retentie de urina > operatie > radiatii >*
(arhiva proprie)
- *In urma cu 3 ani, pacientul (46 de ani, sef de birou) isi inseala sotia. Cand vrea sa incheie relatia extraconjugala, amanta il ameninta ca ii distruge familia = **conflict sexual**. In faza activa, valorile de PSA cresc la 46. Pacientul cunoaste legile biologice si refuza citostaticele. Se confeseaza sotiei si aceasta il iarta. = **conflict rezolvat**. In faza de vindecare, pacientul sufera mai multe zile de retentie de urina, dupa care valorile de PSA scad la 2.*
- *Un pacient isi da seama ca il inseala sotia. Timp de 15 ani ramane in stare de conflict activ, deoarece nu poate sa uite situatia. (arhiva proprie)*
- *Un tata afla ca fiica lui adulta este intr-o relatie in care partenerul ei o obliga practic la acte sexuale. = indirect omul sufera un conflict sexual, preluand perceptiile fiicei (arhiva proprie)*

TESUT AFECTAT: epiteliu glandular - entoderm.

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: Intensificarea functiilor, cresterea unei „tumori” (adenocarcinom) de tip conopidiform. = Proliferare celulara a glandelor prostatice, cresterea valorilor de PSA. La un conflict durabil, se poate ajunge la o tumoare care impiedica „debitul” > probleme la urinare.

SENS BIOLOGIC: Productie marita de secretie prostatica. > Mirosul de mosc accentuat din urina si sperma semnalizeaza femelelor potentia si dorinta de inmultire. De asemenea, cu o productie marita de sperma se pot „invinge” concurentii. > specimenul mai varstnic ii arata femelei ca inca nu a ajuns la zenit si ca inca poate sa tina pasul cu cei tineri.

FAZA DE VINDECARE: Normalizare functionala, descompunere tuberculos-branzoasa a tumorii; urina tulbure, mirositoare, eventual cu sange. Dureri, inflamatie (prostatita), congestiune, transpiratii nocturne. Daca lipsesc bacteriile, tumora se incapsuleaza.

Adezea, dar nu intotdeauna, apare si retentia de urina, prostata avand destul loc in jur pentru a se extinde.

VALORI PSA: Enzima PSA este produsa in principal in glandele prostatice si este un mare parametru pentru marimea prostatei, respectiv a „tumorii”. Din nefericire, regula este urmatoarea: cu cat se masoara mai frecvent valorile PSA, cu atat mai multi barbati (practic sanatosi) mor de „cancer la prostata”. Din perspectiva legilor biologice, analizele preventive de PSA si punctiile nu au absolut nicio valoare. Pentru pacientii care nu cunosc intregul context, **este foarte posibil ca simpla instiintare de genul „ceva nu e in regula cu prostata dvs.” sa declanseze un nou conflict.** - Mai ales diagnosticul „cancer de prostata”, pus pe baza de biopsie, este cu adevarat devastator.

TERAPIE: Aflat si rezolvat conflictul si/sau sinele. Daca se recurge la rezectia transuretrala sau prostatectomie (ablatiune operatorie a prostatei), se ajunge frecvent la impotentia si incontinenta. = conflict nou la prostata si pericol de cerc vicios: conflicte locale de devalorizare in zona bazinului > in termeni alopati - „metastaze osoase”.

NMG: rezectie sau operatie NU in urma valorilor marite de PSA sau a biopsiilor, ci doar atunci cand simptomele impun categoric aceste interventii (retentie indelungata de urina). Inainte de orice fel de operatie, rezolvati conflictul, administrati remedii naturale si eventual medicamente alfa-blocante. Nu se recomanda absolut deloc chimio, radiatii sau blocaje hormonale.

Retentie de urina fara modificari PSA (carcinom prostatic intraductal, neoplazie intraepiteliala prostatica) din perspectiva NMG (Björn Eybl) - conflict la ductele prostatice

CONFLICT: Conflict teritorial cu aspecte sexuale (=combinatie de conflicte la prostata si vezica)

EXEMPLE:

- *Pacientul de 60 de ani are o sotie care nu a fost niciodata prea interesata de sex. Dupa nasterea celui de-al doilea copil, ea nu mai vrea insa deloc sex. = conflict teritorial cu aspect sexual. In decursul unui an, apar probleme tot mai mari la urinat = conflict in recidiva cu vindecare suspendata > inflamatie cronica a ductelor prostatice (arhiva proprie)*
- *Fiica pacientului este casatorita cu un barbat pe care pacientul nu-l poate suferi. Cuplul are un copil, pe care pacientul il iubeste mult. De fiecare data cand el si sotia lui vin in vizita, ginerele pleaca in „excursie” cu copilul, pentru ca socrul sa nu-si poata vedea nepotul. De atunci, pacientul sufera de retentie de urina = conflict teritorial cu aspect sexual (arhiva proprie)*
- *Un taran are o sotie cu 10 ani mai tanara. Intrucat el nu ii permite sa fumeze in casa, ea se duce sa fumeze si sa bea cafea la vecin. Cand taranul se uita mai atent pe geam, o vede pe sotia lui cum este imbratisata de vecin, impreuna cu fiica vecinului. Cu toate ca gestul era cu siguranta doar prietenesc, taranul de atunci trebuie sa se intrebe mereu obsesiv unde e sotia lui. Incepe sa aiba probleme cu urinarea. Cand vorbeste cu sotia lui despre grijile lui, sotia nu se mai duce in vizita la vecin = conflict teritorial cu aspect sexual (vezi Berger-Lenz, Ray, Factorul L, Noua Medicina, Vol. 1)*

TESUT AFECTAT: uroteliu (ductele prostatice) - ectoderm.

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: Depletie celulara in ductele prostatice, neobservata > largirea lumenului.

SENS BIOLOGIC: Marirea diametrului > imbunatatirea debitului > transport imbunatatit de secretii prostatice pentru marcarea teritoriului si pentru a face mai bine curte > mirosul de mosc semnalizeaza femelelor potentia si disponibilitatea de a se reproduce.

FAZA DE VINDECARE: Reconstructia epiteliului glandular. Inflamatie de vindecare, prin aceasta uneori retentie de urina, urina reziduala. Cf. medicinei alopate > „carcinom prostatic intraductal” = refacere puternica a epiteliului de tranzitie.

Cel mai important criteriu: valori PSA neschimbate sau modificate nesemnificativ.

TERAPIE: Conflictul este rezolvat. Se insoteste vindecarea. Se evita recidivele.

REMEDII PENTRU PROSTATA:

- ganduri conducatoare: „Exista lucruri mai importante decat sexul si potentia fizica”; „Nu ma mai identific cu asta de acum inainte”; „Renunt la aceasta dependenta”; „Ma bucur de libertate si de noua calitate a vietii mele!”
- in caz de blocaj uretral se poate pune un cateter pana se reduce inflamatia. Retentia de urina dispare de indata ce conflictul este rezolvat definitiv.
- radacina de yam (progesteron natural), ulei de in, rodie, fruct de palmier pitic, tamaie, preparat din urzici.
- la inflamatii se poate lua un preparat enzimatic (Wobenzym), sare Schüssler nr. 3, borax natural (ingerat), ulei de in.
- selen, zinc, coenzima Q10, vitamina B6, C, E.
- Cayce: masaje regulate ale bazinului si picioarelor cu o combinatie din ulei de masline si ulei de alune; chiropractician.
- alimente alcaline, in special dovleac, seminte de dovleac, sparanghel, stridii, soia (nemodificata genetic, se subintelege), rosii (licopina).
- Ceaiuri: perisor, rascoage, strugurii ursului, frunze si radacini de urzici, ceai verde
- la nevoie, medicamente alfa-blocante.

- o rezectie transuretrala are sens doar cand avem constrictie uretrala (retentie in vezica sau in pelvisul renal, cu urina reziduala) = conflict in recidiva, respectiv in vindecare suspendata.
- terapia hormonala si deprivarea androgenica practicate in medicina alopata dupa o operatie au efect doar in ce priveste valorile de PSA si au foarte multe efecte secundare.

Aceasta deprivare se bazeaza pe ipoteza gresita ca un nivel mare de testosteron ar contribui la proliferarea cancerului. In realitate, exista doar o corelatie intre valorile PSA si nivelul de testosteron.

La cateva saptamani dupa o (eventuala) operatie, ar trebui facuta o analiza hormonala. In caz de lipsuri se recomanda administrarea de progesteron natural si eventual testosteron, hormoni naturali, de ex. dupa dr. Lee, dr. Platt, dr. Lenard, dr. Rimkus.

Psoriazis din perspectiva NMG (Björn Eybl + Ing. Helmut Pilhar)

CONFLICT: Conflict de separare, de atingere, a dori contact sau a nu dori contact; a pierde contactul cu mama, cu familia, cu prietenii etc. In natura, o pierdere de contact cu mama/familia poate fi fatal, ca atare acest conflict este extrem de important!

EXPLICATIE:

1) Conflicte de separare de tipul "nu vreau sa pierd legatura": se rupe contactul, se pierde legatura cu o persoana iubita, un animal drag. Ne simtim parasiti, abandonati. Uneori conflictul este de tip "nu am observat un pericol, nu am putut simti/intui ceva".

Conflictul ne afecteaza interiorul corpului (meridianele Yin): burta, stomacul, pieptul, partea interioara a bratelor si picioarelor, partea interioara cu care imbratisam si tinem strans ceva. Cu stomacul si pieptul ne lipim de cineva care ne este drag.

2) Conflicte de tipul "nu mai vreau sa am contact": cineva ne inghesuie, ni se baga pe gat.

Conflictul ne afecteaza exteriorul corpului (meridianele Yang): spatele, fundul, partile exterioare ale bratelor si picioarelor, coatele, partea exterioara a incheieturilor si genunchilor. Cu coatele, pumnii, picioarele, genunchii ne putem apara, putem respinge persoane nedorite.

Cand conflictul de separare se manifesta la nivelul capului si fetei, avem de-a face cu lipsa mangaierilor (de obicei maternel!), lipsa atingerilor iubitoare dintre parinte si copil, uneori poate fi si un conflict de pierdere a "imaginii publice", modul cum ne vad ceilalti.

TESUT AFECTAT: ectoderm, epiteliul scuamos

FAZA: La psoriazis avem **concomitent** un conflict de separare activ impreuna cu un conflict rezolvat, care se suprapun pe una sau mai multe suprafete ale pielii. Unul din conflicte este **inca activ** (descuamare/decojire) in timp ce altul este in **faza postconflictuala** (piele inrosita, inflamata).

OBSERVATIE: atentie la lateralitate (partea stanga = mama/copil, partea dreapta = partener, prieteni etc.)

Nu va examinati prea mult, sa nu provocati un conflict de "mutilare" - deci lasati oglinda!!

SENS BIOLOGIC: Prin desensibilizare contactul pierdut sau nedorit poate fi ignorat sau reprimat.

TERAPIE: Aflati conflictul, respectiv sinele, si pe cat posibil rezolvati-le in mod real!

GANDURI POZITIVE: "Accept despartirea si privesc inainte!", "Sunt in legatura cu Dzeu. Aceasta legatura nu se va rupe niciodata."

Atingeri multe, mangaieri, masaje, refacerea contactului la nivel de derma.

Frunze de varza alba batute si puse pe pielea afectata.

REMEDII PENTRU PIELE:

- lumina, apa, ploaie, vant ca si stimulente naturale
- vitamina B din drojdie
- vitamina E si A in uleiuri organice presate la rece, in special uleiul de in
- alimentare bazica (de ex. migdale zilnic), reglarea digestiei; sport, masaje (cu ulei de masline), spalut cu sapun din ulei de masline
- ceaiuri si comprese cu ceai: dracila, frunze de mesteacan, frunze de mure, salvie, lumanarica, musetel, soparlita, cicoare etc.

- bai bazice sau cu sare de mare
- Hildegard von Bingen: cimbru, gutui, sfecla rosie
- la inflamatii: comprese cu musetel, argila, cartofi fierti, saruri Schüssler 1, 3, 11, MMS (Miracle-Mineral-Supplement al lui Jim Humble)
- la rana deschisa: miere de albine, frunze de varza, crema de galbenele, crema de tataneasa, propolis
- ulei de masline sau de floarea soarelui (organic) in care se dilueaza 1-2 picaturi de uleiuri esentiale (lavanda etc.)

Rinita/Sinuzita din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT 1: conflict de miros, de tip "Ceva imi pute", "M-am saturat".

CONFLICT 2: conflict de adulmecare, nu putem sa "mirosim" o situatie, nu putem adulmece ce se intampla, nu putem sa evaluam o situatie.

TESUTURI AFECTATE: mucoasa nazala (ectoderm dupa schema piele exterioara), mucoasa sinusurilor (ectoderm dupa schema mucoasa faringiana)

FAZA ACTIVA A CONFLICTULUI: pierdere celulara (ulcerare) a mucoasei (epiteliu scuamos) in nari sau sinusuri. Cu cat conflictul dureaza mai mult, cu atat se accentueaza ulcerarea celulara nazala. Mucoasa uscata, cruste uscate etc.

SENS BIOLOGIC: mai mult loc pentru a mirosi, pentru a adulmece mai bine

FAZA DE VINDECARE: reconstructie celulara, inflamare si stramtare a narilor si sinusurilor, respiratie dificila (stridor nasalis), mancarime, evtl. sangerare, simptome de "raceala" sau "guturai".

Accentuare prin *sindrom*

TERAPIE: conflictul e rezolvat. Se insoteste vindecarea. La recidive, trebuie aflat si rezolvat conflictul, respectiv de ce se intra pe sine si pe recidive.

GANDURI POZITIVE: "Putea fi si mai rau, asta e, viata uneori e imputita!", "N-o mai iau in tragic si ma bucur de viata", "Chiar daca nu stiu ce ma asteapta, am incredere ca va fi bine!"

Ceaiuri: menta, nalba, salvie, silnica, soc, maghiran, coada soricelului

Dusuri nazale cu apa cu sare de mare.

Inhalatii cu uleiuri eterice: Cajeput, eucalipt, lavanda, cimbru.

Drenaje sau masaj limfatice.

Bai fierbinti la picioare cu sare de mare.

Plimbari la aer rece.

Saruri Schüssler: 3, 8, 10

In caz de cronicizare: expunere la lampa medicala cu infrarosii

Picaturi sau spray decongestionant DOAR in cazuri extreme, DOAR inainte de culcare si DOAR cateva zile. In caz de abuz, mucoasa nazala este vatamata si se inflameaza apoi tot mai des, pt. a se repara, iar noi dam iar picaturi/spray, accentuand cercul vicios!

"Rinita alergica" din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Cf. medicinei alopate, alergiile sunt reactii gresite ale sistemului imunitar, celule de aparare proprii organismului (limfocite T si B) care ar incepe brusc sa reactioneze "aiurea" la polen, praf, mucegai etc. In realitate, alergiile sunt intotdeauna **SINE**, iar cel mai adesea este afectata mucoasa nazala.

Durata activitatii conflictuale este variata (incepand de la cateva secunda pana la cateva zile).

De cele mai multe ori se (re)intra in faza activa a conflictului, iar faza de vindecare dureaza mai mult = vindecare suspendata ("alergii")

O conjunctivita suplimentara indica un conflict vizual de despartire, gatul inflamata indica un conflict de inghitire ("nu vreau sa inghit ceva"), "bronsita" indica niste conflicte de spaima sau teritoriale (de asemenea, un singur conflict poate porni mai multe programe biologice speciale).

TERAPIE: rezolvarea conflictului, respectiv a sinelor.

In rest, vezi mai sus, la rinita/sinuzita.

Scarlatina din perspectiva NMG (Björn Eybl) - cu simptome pe piele

Diagnosticul de „scarlatina“ cuprinde mai multe simptome, fiecare dintre ele trebuie analizat individual.

Simptom principal = „limba zmeurie“ (vezi mai jos)

CONFLICTUL LA EXANTEM SCARLATINOS: Conflict puternic/brutal de separare; o despartire perceputa foarte dureros, nedrept sau urat.

EXEMPLU:

- *Fratele mai mare al unui baiat de 4 ani isi aniverseaza ziua de nastere. Familia merge intr-un magazin de jucarii, iar fiul mai mare isi poate alege ce vrea el. Isi alege o masina cu pedale. Fratele mai mic vede masina, fugе spre ea si vrea sa se urce in ea. Mama il opreste imediat: „Asta este pentru ziua fratelui tau!” Micutul incepe sa planga.=conflict intens de separare legat de mama/frate. Urmeaza un exantem scarlatinos in faza postconflictuala = refacerea epidermei (vezi www.germanische-heilkunde.at/index.php/erfahrungsberichte).*

FAZA: faza de vindecare a conflictului de separare - reparatie pe suprafata mare a stratului bazal al epidermei. = exantem scarlatinos

TERAPIE: conflictul este incheiat, se insoteste vindecarea, se evita recidivele.

REMEDII: vezi la „Piele”

Scarlatina din perspectiva NMG (Björn Eybl) - cu simptome la gura

CONFLICT: Conflict de separare implicand buzele, gura sau limba. A se simti despartit de cineva sau a dori o despartire. A nu putea sa spunem ceva, a nu dori sa spunem ceva, a nu avea voie sa spunem ceva. A dori sa retragem ceva ce am spus. A dori contact sau a evita orice contact (de pilda o atingere, sarut etc.). Acelasi tip de conflict se aplica si la mancare sau diete: a-si refuza anumite alimente dorite etc.

SIMPTOME: mucoasa bucala si limba inrosita, inflamata, „limba zmeurie” si amigdale inflamate.

EXEMPLE:

- *Un copil vrea neaparat un dulce si nu-l primeste.*
- *Un copil este „dezvatat” de suzeta.*

FAZA:

- Mucoasa bucala inflamata, „limba zmeurie” => **faza de vindecare a conflictului de separare** cu refacerea epitelului scuamos.
- Amigdale inflamate => **faza de vindecare a conflictului de imbucatura.**
- Exantem => **faza de vindecare a conflictului de separare.**

TERAPIE: conflictul este incheiat, se insoteste vindecarea, se evita recidivele.

REMEDII: vezi la "afte"

Sclerodermie (intarirea pielii) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de devalorizare, de a nu se simti frumos sau estetic in acea zona a corpului sau a chipului.

SIMPTOME: Pielea devine tare si nu mai e elastica, prin intarirea tesutului conjunctiv hipodermic.

TESUT AFECTAT: fibrele de colagen si elastina - tesut conjunctiv hipodermic - strat medular - mezoderm.

FAZA: conflict in recidiva, in vindecare suspendata. Din cauza alternantei de pierdere celulara si refacere celulara pielea se intareste si apare ca o "contractiune (strangere) cicatrizanta".

TERAPIE: aflarea conflictului, respectiv a sinelor, si rezolvarea reala, pentru ca programul biologic special sa se poata incheia.

REMEDII: la capitolul "Remedii pentru piele"

Scleroza multipla, paralizii, polio, ALS (scleroza laterala amiotrofica) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict motoric. Conflict de incordare, de frica de a se misca, a paraliza de frica. Conflict de a nu se putea sau a nu vrea sa se miste.

EXEMPLE:

- *Pensionar de 63 de ani care nu se plictiseste niciodata., e f. activ, sportiv si tamplar pasionat. Intr-o zi, la schi, isi fractureaza soldul. Timp de patru luni i se recomanda sa se menajeze total. = Conflict motoric de a nu avea voie sa se miste. Dupa aceasta pauza fortata, este trimis la recuperare si face acolo progrese mari. Isi da seama ca e pe cale sa-si revina, sa redevina cum era inainte. = Rezolvarea conflictului. Acum incep noaptea dureri puternice in gambe. Crampele dureaza saptamani si devin tot mai dureroase. Pentru el aceste spasme sunt mai dureroase decat fractura soldului. = Conflict motoric din cauza crampelor = cerc vicios. Dupa mai multe consulturi, ajunge in spital, unde i se face punctie lombara, RMN si teste la terminatiile nervoase. Doctorii deja il priveau cu expresii ingrijorate: diagnostic „ALS” (scleroza laterala amiotrofica). I se explica „patologia progresiva” si cum in final vine decesul prin sufocare, din cauza paraliziei generalizate. = Conflict motoric generalizat, de a fi paralizat in curand. In decurs de 6 luni deja, fostul sportiv este in carucior si nici in pat nu se mai poate rasuci singur. = Cerc vicios si confirmarea pronosticului („self-fulfilling prophecy”). Un caz foarte tragic (arhiva proprie).*
- *O femeie de 50 de ani, dreptace, merge la neurolog din cauza unor dureri la obraz. Neurologul ii prescrie analgezice si antidepresive. Ambele medicamente au pe prospect la efecte adverse paralizia. Dupa ce le ia cateva saptamani, pacienta incepe sa simta amorteli in piciorul drept. Durerile persista. Dupa alte consultatii la medici neurologi, inclusiv CCT si punctie lombara, se pune diagnostic de scleroza multipla. = Conflict motoric din cauza diagnosticului: pacienta se vede deja in carucior cu rotile si deja isi cumpara baston, fara sa aiba nevoie de el! > Simptomele de paralizie se accentueaza. > Incepe un cerc vicios care se adanceste (arhiva proprie).*

TESUT AFECTAT: musculatura striata - scoarta cerebrala - ectoderm (inervare = tonifierea nervilor), in general in combinatie cu substanta alba - mezoderm (nutritie)

FAZA: Scleroza multipla este **faza activa suspendata** (recidiva continua).

OBSERVATIE: Diagnosticul de scleroza multipla este pana si in conceptia alopata f.f.f.f. "alunecos" si ambiguu. In lichidul cefalorahidian se masoara niste proteine care apar la fel si la oamenii sanatosi. La CCT si RMN se cauta niste "pete albe" dubioase, care exista la toata lumea. Prin diagnosticul "scleroza multipla" se declanseaza un alt conflict motoric, de cele mai multe ori mai grav decat cel initial. Multi pacienti deja se vizualizeaza in carucior cu rotile (engrama posthipnotica). Abia acest conflict este cel pe care cei mai putini oameni il mai pot rezolva ulterior = conflict activ recidivant cauzat de diagnosticul medicului (iatrogen). Si o mare parte dintre oamenii paralizati fac parte din aceasta categorie.

TERAPIE: aflarea si rezolvarea reala (pe cat posibil) a conflictului, respectiv a sinelor.

Foarte important: intelegerea imaginii globale si a conexiunilor simptomatice.

Ganduri de baza: „Acum stiu ce se intampla si ma eliberez!”, „O sa ma misc iar ca inainte!”

Terapie motorica, dar fara presiune de a reusi (presiune autoimpusa).

Orice masuri terapeutice stimulatoare, de ex. masaj clasice, acupunctura, masaj zone reflex

Cayce: masaj puternice cu ulei de alune sau de masline cu tinctura de smirna.

Inot, gimnastica, yoga etc.

Bai de soare, eventual solar, perieri si dusuri scotiene

Masaje cu ulei de rozmarin, de scortisoara sau de camfor.

Alte cauze ale paraliziiilor:

- Accidente sau operatii gresite (paralizii mecanice)
- Otravire, de ex. prin medicamente (paralizii toxice)
- Presiune intracraniana (edem) pe releul motoric din jurul unui focar Hamer (frecvent avem aici un conflict de devalorizare care intra in vindecare)

Sindrom de canal carpian din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: La artrozele si poliartritele degetelor este vorba de un **conflict de devalorizare** ref. la indemanare: am nedreptatit pe cineva, am pus mana pe ce nu trebuia, am facut ceva gresit. Am dat gres in ceva (perfectionism).

Poate fi si un **conflict de devalorizare local**, evtl. dupa o fractura, cand mana nu mai poate fi folosita 100% fara probleme.

La sindromul de canal carpian persoana se afla in faza de vindecare suspendata: reconstructie masiva a canalului carpian, resp. a tendoanelor > intarirea structurilor, stramtarea canalului carpian; inflamare, dureri = sindrom de canal carpian.

SENS BIOLOGIC al durerilor: stare de repaos pt. reconstructie.

TERAPIE: rezolvarea conflictului, resp. a recidivei, pt. ca faza de vindecare suspendata sa ia sfarsit.

Dupa faza acuta, gimnastica de intindere, exercitii pt. maleabilitate.

La dureri acute, tb. deviata energia.

Comprese reci, dusuri reci, evtl. gheata (gheata direct pe mana doar max. 2 minute, altfel se creeaza hiperemia reactiva cu efect de incalzire!).

Alimentatie bazica, a se evita carnea.

Uleiuri eterice (diluata cu ulei de maslin): lavanda, menta, melisa, musetel.

Acupunctura, masajul punctului reflex.


Argint coloidal.

Salba Traumeel (homeopatica)

Comprese cu branza de vaci.

Foi de varza alba batute si puse pe locul dureros.

"Tumori" cerebrale (astrocitom, glioblastom, oligodendrogliom, endimom, plexuspapilom, gangliocitom, gangliogliom) din perspectiva NMG (Björn Eybl)



Tesutul nervos consta din 90% tesut conjunctiv (= substanta de suport, asemanatoare cu o plasa) si 10%

tesut neuronal. Conform medicinei alopate, tumorile cerebrale sunt „excescente tisulare” in creier. Cu toate acestea, neuronii nu se mai pot inmulti dupa nastere deloc sau aproape deloc. In cazul „tumorilor cerebrale” este vorba exclusiv de tesut conjunctiv (celule glia), care creste sau se modifica. Niciodata nu sunt gasite excescente alcatuite din neuroni - fie si acest simplu fapt si este suficient pentru ca diagnosticul sa-si piarda din dramatism!

CONFLICT: In functie de localizarea tumorii.

EXEMPLU:

- *O pacienta de 21 de ani, stangace, este diagnosticata cu „tumoare cerebrala” cand i se fac analizele in spital in urma unui lesin. La un terapeut care cunoaste NMG pacienta afla ca „tumoarea cerebrala” se afla in releul care controleaza ovarul. ca atare, este vorba de un conflict de pierdere aflat in faza de vindecare. Conflictul are o vechime de 6 ani: Hexi, cainele adorat al pacientei, fusese calcat de o masina. Cainele zace pe strada zdrobit, zvavnind. In stare de soc, pacienta nu merge cu parintii la veterinar cand acestia duc cainele la eutanasiere = conflict de pierdere. In toti anii urmatori, de fiecare data cand vede un caine se gandeste la Hexi si cum l-a „abandonat” si „dezamagit” in cele mai grele momente (recidiva). Pacienta intra in faza de vindecare cu 5 luni inainte de primul lesin, cand primeste cadou un alt caine, Akira. de atunci nu mai e silita sa se gandeasca la Hexi, dar se simte frecvent foarte obosita (vagotonie). „Tumoarea cerebrala” este martora vindecarii (arhiva proprie)*

FAZA: Faza de vindecare - reconstructia tesutului conjunctiv, retinere de apa - de cele mai multe ori in legatura cu un *sindrom* [vezi la finalul documentului - n.t.]. Din perspectiva celor 5 legi biologice, o „tumoare cerebrala” nu este niciodata o „boala” in sine, ci arata clar ca in zona respectiva a avut sau are loc un program biologic special. este vorba de o faza de vindecare in desfasurare sau incheiata. Uneori chiar si focare Hamer foarte vechi sunt interpretate ca si „tumori” > Tumoare cerebrala = o masa cicatriceala de tesut conjunctiv. (Ce om normal ar intra in panica de moarte daca ar vedea ca se mareste o cicatrice cutanata?)

OBSERVATIE: „Tumorile cerebrale” sunt tot mai frecvent diagnosticate doar fiindca pacientii sunt scanati mai frecvent si cu mai mare precizie (Röntgen, CT, RMN). Mai demult, pacientul avea pur si simplu 3 luni de zile dureri de cap. Nu se stia de ce, dar pacientul era lasat in pace. Astazi se cauta inasa foarte intens. Inklusiv analizele preventive contribuie la faptul ca se gasesc tot mai multe „tumori cerebrale” care nu ar fi reprezentat absolut nicio problema. Diagnosticul de „tumoare cerebrala” este mai degraba ceva fatal, abia 2% din pacienti supravietuiesc unui asemenea diagnostic. Majoritatea mor inutil, de frica sau din cauza chimioterapiei si radioterapiei.

TERAPIE: Conflictul este rezolvat! Se insoteste vindecarea, se evita recidivele.

Decisiv aici este ca pacientul sa cunoasca cele 5 legi biologice ale naturii, pentru a iesi din cercul vicios al fricii.

Focarele Hamer aflate in vindecare retin apa > focarul se intinde si la alte rele din jur. Creierul nu are receptori de durere, in schimb meningele cerebral are. Prin presiunea asupra membranei cerebrale, apare durerea de cap. In cazurile grave, trebuie facut orice pentru a reduce presiunea intracraniana, caci acest factor este decisiv in supravietuirea pacientului.

MASURI TERAPEUTICE AJUTATOARE LA NIVELUL CEREBRAL:

- rezolvarea *sindromului* (conflictului de fuga, de abandon, conflict de spaima de singuratate etc...), daca acesta este inca activ;
- racirea capului (dusuri reci, comprese reci, pungi cu gheata);
- plimbari in aer rece;
- protejat capul de soare si caldura;
- dextroza organica („energie rapida”), eventual Maltodextrin 19 (energie rapida care tine mai mult) luat la intervale scurte, mai ales noaptea (cand avem faza cea mai puternica de vagotonie). Dextroza se tine in gura pana se topeste.
- Vagotonia prea puternica mai poate fi amortizata cu vitamina C, cafea, ceai negru

- Borax natural intern, bere de malt
- Bai cu sare de mare, 0,9% sau si mai concentrata (marea este locul de unde ne tragem cu totii!). Si prin presiunea osmotica se poate ajuta la reducerea lichidului din corp si creier.
- Drenaje limfatice ale capului si fetei.
- Picioarele si capul sunt poli care se influenteaza reciproc. Cand incalzim si stimulam picioarele, eliberam si usuram capul din punct de vedere energetic. > mers pe jos descul, bai fierbinti la picioare, masaje la picioare.
- Fara infuzii saline, cacii sarea leaga apa in organism. Mancare cu cat mai putina sare.
- Fara infuzii de glucoza, cand avem posibilitatea de a lua glucoza oral (zaharul din sange leaga apa suplimentar).
- Vizualizare: din cap curge energie prin coloana spre picioare; capul se goleste; picioarele se umplu de energie; capul este in lumina albastra, vindecatoare;
- Eventual argint coloidal sau MMS sau -doar in cazuri extreme- cortizon pentru reducerea intensitatii fazei vagotone, dar nu atunci cand este si un *sindrom* prezent [pt. *sindrom*, vezi la finalul documentului - n.t.].

Operatia, deci eliminarea chirurgicala a focarelor Hamer identificate in mod gresit ca „tumori cerebrale”, nu este indicata, iar chimioterapia sau radiatiile nici atat!

"Tumori" osoase (osteoblastom, osteom, osteoidosteom, sarcom Ewing, osteosarcom etc.) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de autodevalorizare, in functie de localizare; la clavicula/umar: conflict de a crede ca nu suntem o mama buna sau un copil bun (umarul stang la dreptaci) sau ca nu suntem un partener bun (umarul drept la dreptaci).

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: depletie celulara (pierdere de masa celulara (osteoliza)), fara dureri

FAZA DE VINDECARE: reconstructia substantei osoase = "tumoare" conform medicinei alopate

SENS BIOLOGIC: intarire, forta

OBSERVATIE: majoritatea "tumorilor" osoase sunt, cf. medicinei alopate, asa-numitele "metastaze" (tumori secundare). In realitate, oamenii sufera conflicte locale de devalorizare, prin diagnostic de cancer sau "terapii" de distrugere (operatii, radiatii, citostatice). De ex., dupa diagnostic de cancer la san, apare un conflict local de devalorizare de tip "Nu mai sunt femeie!", care se manifesta la nivel local la coaste sau stern (in medicina alopata = cancer la oase).

Din pacate, se mai fac si punctii > substanta osoasa inca lichida (callus) incepe sa curga si se intareste in tesutul din jurul punctiei = "osteosarcom" pt. medicina alopata, adica "dovada" fictiva a "malignitatii" > osteosarcoamele apar insa doar prin malpraxis medical, adica prin punctie.

Asa-zisele "tumori osoase primare" sunt descoperite doar cand pacientul se plange de dureri. Mai demult oamenii ramaneau acasa, se odihneau si le trecea. Astazi, cu tehnica perfectionata, se cauta si se cauta pana se gaseste "ceva" de "tratat".

Pe CT medicii interpreteaza acum nu numai zonele hiperdense (ingrosari tisulare) ca fiind suspecte de cancer, ci si zonele hipodense (deci cu o densitate redusa)!! = "tumora cu celule gigante", "osteoclastom".

TERAPIE: Conflictul este rezolvat! Se insoteste vindecarea, se evita recidivele! Sa nu se faca punctie in niciun caz!!

TERAPIE: Menajarea zonei respective, miscare doar cat nu doare.

DIRECTIE DE BAZA: deviere de energie.

Dusuri reci, comprese reci, comprese reci cu sare. Impachetari scurte cu gheata (scurte ca sa nu se ajunga la hiperemie).

Comprese cu branza de vaci sau cu argila, flori de fan

Frunze de varza alba batute si puse pe locul dureros

Masaje cu bitter suedez, tinctura de tamaie sau de smirna.

Masaje f. usoare cu uleiuri eterice (diluata in ulei de masline): lavanda, menta, roinita, musetel.

Drenaje limfatice, acupunctura, masajul zonelor reflexogene

Alimentatie bazica, fara carne

Preparate enzimatice (de ex. Wobenzym), salba Traumeel

Saruri Schüssler 3, 4, 9 (pot fi programate cu apa si paharul, metoda scarface)

Lampa cu lumina albastra

NOTA BENE: Toate masurile terapeutice pt. a incetini inflamatiile vor diminua simptomele si durerile, dar vor prelungi procesul de vindecare.

"Tumori" testiculare (carcinom testicular, seminom, LCT - celule tumorale Leydig etc.) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: pierdere sau frica de a pierde o persoana apropiata, un animal apropiat.

EXEMPLE:

- O persoana draga sau un animal drag moare.
- Cineva este parasit de partener.
- Un copil se muta din casa parinteasca.
- Cineva ramane singur dupa divort.
- Mama unui baiat de 13 ani moare = conflict de pierdere. La 58 de ani, ii moare sotia si el reintra pe vechea sina de conflict de pierdere. Cand se impaca cu pierderea, simte o perioada o durere in testicul = faza de vindecare - reconstructia celulelor. Pe CT-ul creierului se poate vedea ca acel conflict original, declansat de moartea mamei, este foarte vechi. (*arhiva proprie*)
- Un dreptaci de 63 de ani a suferit la 38 de ani un conflict grav de pierdere: prietena mai tanara incheie relatia peste noapte. Conflictul se rezolva abia doi ani mai tarziu, cand o intalneste pe noua partenera. In aceasta perioada este diagnosticat cu o inflamatie testiculara (= faza de vindecare). *Observatie:* la fel de bine diagnosticul putea sa fie „cancer testicular”. (*arhiva proprie*)
- Partenera pacientului are un atac epileptic grav, se invineteste la fata. Pacientul s-a speriat ca ii moare langa el = conflict de pierdere. (*relatare dintr-un forum*)
- Un om isi gaseste pisica cea draga moarta in casa scarii = conflict de pierdere (*arhiva proprie*)

TESUT AFECTAT: Tesutul conjunctiv la nivel testis - strat medular - mezoderm

FAZA DE CONFLICT ACTIV: Depletie celulara („gauri” = necroza testiculara) > hipofunctie a gonadelor > scaderea nivelului de testosteron, adesea neobservata

FAZA DE VINDECARE: Reconstructia tesutului. Inflamarea testiculului (orhita), umflare, dureri. Din „gauri” creste un chist, care se imbrina cu tesutul functional = „tumoare” conform medicinei alopate.

SENS BIOLOGIC: Tesut testicular suplimentar duce la productia de mai mult testosteron si de mai multi spermatozoizi > Accentuarea apetitului sexual si imbunatatirea fertilitatii. Prin aceasta, pierderea suferita poate fi compensata rapid.

OBSERVATIE: Atentie la lateralitate (mama-copil sau partener)!

TERAPIE: Conflictul este rezolvat! Se insoteste vindecarea, se evita recidivele. Eventual operatie, daca tumoarea deranjeaza sau este prea mare!

Tusea din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: tusea este simptom in faza de rezolvare a unui **conflict de teritoriu sau soc de spaima**.

TESUT AFECTAT: bronhiile - epiteliu - ectoderm

FAZA DE CONFLICT ACTIV: pierdere de masa celulara la nivel de mucoasa bronhiala, adesea neobservata.

SENS BIOLOGIC: marirea diametrului traheei, pt. o respiratie mai efectiva care sa dea puterea de a apara teritoriul.

FAZA DE VINDECARE: refacerea mucoasei = inflamare (fals diagnosticata ca "bronsita"), uneori pneumonie: inflamare, inrosire, tuse puternica, evtl. cu sange uneori, dureri; la inflamare puternica se poate ajunge la atelectaza (colaps partial al unui plaman); de indata ce inflamarea se reduce, caile respiratorii se redeschid. "Bronsita" se prelungeste prin recidive, sine SAU medicatie alopata care intrerupe faza de vindecare aruncand corpul inapoi in simpaticotonie.

FAZA EPILEPTOIDA din perioada de vindecare: tuse, tuse usor convulsiva, repetitiva, cu implicarea musculaturii bronhiale, evtl. frisoane etc.

TERAPIE: constientizarea ca e vorba de un conflict rezolvat. Insoțirea vindecării; evitarea recidivelor! Drenaje limfatice (la adulti), ceaiuri de salvie, patlagina, unghuras (voronic), bai de soare, ulei eteric de ace de pin (din ala de calitate!!)

Varice din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de devalorizare de tip "piatra de gat" sau "ceva ma trage inapoi"

EXEMPLU: Pacienta in varsta de 59 de ani se bucura ca iese in curand la pensie, planifica deja calatoriile si alte activitati. La doi ani dupa pensionare, mama ei ajunge in carucior cu rotile, imobilizata. Ea se afla intr-un camin, dar pentru pacienta s-a dus planul cu calatoriile, ar mostra-o constiinta daca nu si-ar vizita mama zilnic. Pe mama o percepe ca pe o piatra de gat, ca pe o greutate la picioare. Conflictul intra temporar in rezolvare de indata ce pacienta se adapteaza la situatie. In decursul anilor apar varicele.

TESUT AFECTAT: Vene - perete interior al vaselor - mezoderm - strat medular

FAZA: *Conflict in recidiva*, vindecare suspendata - inflamare treptata a venelor > ingrosare a venelor. Acest program special afecteaza si clapetele din interiorul venelor, lucru care duce la regenerare cu cicatrici. > Clapele care nu mai sunt intacte nu mai reusesc sa faca fata presiunii sangelui.> Dilatare, ingrosare si "serpuire" a venelor = varice.

OBSERVATIE: Dupa dr. Hamer, in ingrosarea venelor joaca un rol si musculatura neteda a vaselor de sange: ingrosarea muschilor netezi are loc in faza de conflict activ, prin aceasta natura compenseaza subtierea peretelui venal. Musculatura neteda ramane insa ingrosata dupa incheierea programului biologic special. > Vene ingrosate - "vene varicoase".

Atentie la lateralitate!

TERAPIE: Rezolvarea reala a conflictului sau a sinelor, pentru ca procesul de vindecare sa se poata incheia.
- *ganduri:* "Sunt liber si independent, ca o pasare in vant!", "Ma eliberez de tot balastul!", "Pot sa fac ce vreau!"

- multa miscare, sport, gimnastica, inot
- ciorapi compresivi
- alimentatie bazica, in special hrisca
- greutate corporala redusa
- evitat statul in picioare sau statul jos mult timp
- stat cu picioarele la inaltime
- Kneipp, dusuri reci
- masaj limfatice, masaj
- Cayce: comprese cu frunze de lumanarica sau ceai de lumanarica
- masaj sau comprese cu zeama rece de scoarta de stejar
- saruri Schüssler 4, 9, 11.

Vezi – Programe speciale ale mucoasei superficiale (urocistita, carcinom urotelial, carcinom urotelial papilar etc.) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict teritorial. Granitele propriului teritoriu nu sunt respectate, nu pot fi marcate, delimitate.

EXPLICATIE: A nu se putea delimita, a nu-si putea delimita teritoriul. A nu sti unde este teritoriul (locul) propriu. In natura, lupii masculi isi marcheaza granitele exterioare, lupoaicele pe cele interioare.

La barbati este vorba mai ales de teritoriul „extern” (loc de munca, masina, club sportiv etc.)

La femei este vorba mai ales de teritoriul „intern” (partener, copii, prietene, locuinta etc.)

Horst Köhler explica in „Lexiconul Noii Medicine” ca cel mai intim teritoriu al femeii este propriul corp.

Controale ginecologice, acte sexuale nedorite sau „tolerate” sunt unul din motivele pentru care femeile dezvolta mai des simptome ale sistemului urinar.

Partea dreapta (ureter drept) = partea „feminina” = conflict de a nu-si putea marca granitele interioare ale propriului teritoriu.

Partea stanga (ureter stang) = partea „masculina” = conflict de a nu-si putea marca granitele exterioare ale propriului teritoriu.

Tesut: mucoasa vezicii, celulele de tranzitie – ectoderm.

FAZA DE CONFLICT ACTIVA: depletie celulara a mucoasei in vezica, uretere, respectiv uretra. Totul se petrece fara dureri, fara sangerari.

SENS BIOLOGIC: prin reducerea masei celulare se mareste capacitatea de retinere de urina, respectiv sectiunea transversala a ureterelor si uretrei. > Se stocheaza mai multa urina, respectiv urina este eliminata printr-un jet mai puternic, pentru a marca mai bine teritoriul

FAZA DE VINDECARE: reconstructia mucoasei = cistita (inflamarea vezicii), inflamarea ureterelor sau a uretrei = „cancer la vezica” (carcinom urotelial), inflamatie a mucoasei vezicii, dureri, usturimi la urinare, polachisurie (emisia repetata de urina in cantitati reduse), eventual sange in urina (hematurie) si uneori incontinenta. Prin inflamarea din faza de vindecare urinarea poate fi inhibata, mai ales in caz de „sindrom” (aparitia unui conflict secundar).

EPICRIZA (CRIZA EPILEPTOIDA): dureri, sange in urina, crampe din cauza implicarii musculaturii vezicii, eventual frisoane sau usoare absente (absence).

ENUREZIS NOCTURN: acelasi program biologic special cu participarea musculaturii vezicii – faza de vindecare. Situatii tipice de enurezis nocturn la copii: aparitia unui fratior sau a unei surioare, divortul parintilor, refuzul unei camere proprii etc.

OBSERVATIE: 90% din tumorile vezicii sunt carcinoame uroteliale. Cistitele cronice = conflict recidivant > ingrosare cicatrizanta a mucoasei (metaplazie scuamoasa uroteliala) > „vezica iritabila”

TERAPIE: Conflictul este rezolvat. Se insoteste vindecarea. Daca recidiveaza, trebuie aflat si rezolvat conflictul in mod real, daca se poate.

GANDURI (la recidive): „Stiu ce vreau!”, „Teritoriul meu imi apartine mie!”, „Eu stabilesc granitele si ele sunt respectate!”

REMEDII PENTRU VEZICA

Ceaiuri: ceai de salvie, fenicul, bradisor, musetel, coada calului, paraluta, bobornic Bors.

La inflamatii acute: consumat lichide multe, in special bere.

Masaje la osul sacral, la sezut si la picioare.

Reflexoterapie, masaj cu acupunctura.

Bai fierbinti la picioare, picioarele sa fie mereu calde.

Bai fierbinti pt. tot corpul, eventual cu ceaiurile de mai sus.

La dureri de rinichi in caz de vindecare suspendata, se pot da antibiotice.

Exercitii pentru zona pelviana, antrenament muscular pentru intarirea musculaturii vezicii si pentru imbunatatirea vitalitatii. Din punct de vedere energetic, aceasta zona este baza energiei vitale (chakra radacina).

Cele mai bune ore dupa ceasul organelor interne pentru administrarea remediilor pt. vezica: orele 15-17.

Zona Zoster din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de murdarire, ne simtim murdariti, desfigurati sau atacati; ne este atacata propria integritate.

Explicatie: Lovitura/rana reala (lovitura, impingere, palma) sau murdarire reala (mizerie, fecale, urina etc.) sau ranire si murdarire si atac prin cuvinte. Adesea la cearta, dispute, jigniri sau cand primesti un diagnostic medical.

EXEMPLU:

- O mama afla ca fiica ei este lesbiana. Se simte murdarita de imbratisarea cu fiica. > Proliferare celulara a dermei in faza activa. In faza de vindecare apar simptome de zona zoster (vezi dr. Hamer, tabel, pag. 49)
- O fetita de 12 ani, dreptace, are un tata foarte dominant. Intr-o seara, tatal o atinge pe fetita la san. Fetita stie ca „nu era o atingere normala”. = Vatarea propriei integritati. Chiar si dupa 40 de ani de la acea intamplare, femeia intra pe sina cand tatal ei ridica vocea la ea sau o critica. > In faza de vindecare face zona zoster la sanul stang. (Arhiva proprie)

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: Aparitia unor mici tumori melanotice sub epiderma de-a lungul unor segmente neuronale individuale (radacini nervoase).

SENS BIOLOGIC: Intarirea si consolidarea dermei, pentru protectie

FAZA DE VINDECARE: Descompunere branzos-tuberculoasa a „tumorilor”. La zona zoster deschisa se formeaza vezicule pline cu lichid, care se usuca treptat.

OBSERVATIE: Simptomele de zona zoster apar frecvent in combinatie cu un program biologic special al epidermei (conflict de separare aflat in faza de vindecare). Simptomele se accentueaza prin *sindrom* (vezi la finalul documentului). Atentie la lateralitate!

TERAPIE: Conflictul este incheiat, se insoteste vindecarea, a se evita recidivele!

Preparate enzimatice, foi de varza batute bine si puse ca si comprese. Vezi de asemenea remediile pentru piele (la Psoriazis).

~~~~~

**Sindrom** = combinatia de 2 programe biologice: uneori -alaturi de alt conflict aflat in vindecare- apare un conflict suplimentar existential, conflict de refugiat, de abandon, conflict de spaima de singuratate („ca pestele pe uscat”) etc... acesta se reflecta prin asimilare de apa in tubii colectorii renali, cresterea cantitatilor de acid uric si creatinina, rinichii nu mai pot elimina aceste substante...Teoretic, in caz de sindrom prima prioritate o are rezolvarea conflictului suplimentar!!